

HOME

DIABETES

OBESIDAD

DISPOSITIVOS

AGUJAS

CONTACTO

Vademecum Novo Nordisk®

HOME

DIABETES

OBESIDAD

DISPOSITIVOS

AGUJAS

CONTACTO

INSULINA ULTRAPROLONGADA

INSULINAS MODERNAS

ANÁLOGO DE GLP1

GLUCAGEN® HYPOKIT

TRESIBA®
insulina degludec

Fiasp®
insulina aspártica

SEMANTAL
OZEMPIC®
semaglutida

GlucaGen®
HypoKit

NovoRapid®
insulina aspártica

Victoza®
liraglutida

NovoMix 30 FlexPen®
insulina aspártica bifásica

Insulatard®
insulina humana
isófana (NPH)

Diabetes

INSULINA ULTRAPROLONGADA

TRESIBA[®]
insulina degludec

Insulina de acción
ultraprolongada
efecto plano y
estable por más de
42 horas



*Perfil de la tasa de infusión de glucosa (TIG), estado estacionario.
Perfil medio 0-24 hs. - Ideg 100 U/ml 0,6 U/Kg.

*Insulina Degludec 100 U/ml es bioequivalente a Insulina Degludec 200U/ml



Tresiba[®] FlexTouch[®]
Insulina degludec 200 U/ml

Presentación:

Envase conteniendo 3 lapiceras x 3 ml.
Cada lapicera contiene 600 unidades
de insulina degludec

VER INFORMACIÓN
DE PRODUCTO.
Certificado N° 57.336



Diabetes

INSULINAS MODERNAS

Fiasp[®]
insulina aspártica




Fiasp[®] FlexTouch[®]



Fiasp[®] Penfill[®]

Insulina aspártica con
excipientes que permiten un
inicio de acción más rápido

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24Hs



Cuadro de acción

VER INFORMACIÓN
DE PRODUCTO.
Certificado N° 59.099



Diabetes

INSULINAS MODERNAS

Novo Rapid[®]
insulina aspártica




NovoRapid[®] FlexPen[®]



NovoRapid[®] Penfill

Inicio de acción: 10 a 20 minutos
MÁXIMA acción: 1 a 3 horas
Duración: 3 a 5 horas

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24Hs



Cuadro de acción

VER INFORMACIÓN
DE PRODUCTO.
Certificado N° 48.419



Diabetes

INSULINAS MODERNAS


NovoMix 30 FlexPen[®]
insulina aspártica bifásica



NovoMix[®] 30 FlexPen[®]

Inicio de acción: 10 a 20 minutos
MÁXIMA acción: 1 a 4 horas
Duración: 24 horas

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24Hs



Cuadro de acción

VER INFORMACIÓN
DE PRODUCTO.
Certificado N° 50.507



Diabetes

INSULINAS MODERNAS

Insulatard®

insulina humana
isófana (NPH)



Insulatard® FlexPen®



Insulatard® Penfill®



Insulatard®


Inicio de acción:

1 hora 30 minutos

MÁXIMA acción: 4 a 12 horas

Duración: 24 horas

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24Hs



Cuadro de acción

VER INFORMACIÓN
DE PRODUCTO.
Certificado N° 38.987



Diabetes

ANÁLOGO DE GLP1

SEMANTAL
OZEMPIC[®]
semaglutida

**Presentaciones:**

- **Ozempic[®] 0,25 mg; 0,5 mg/dosis:** 1 lapicera prellenada de 1,5 ml con 6 agujas descartables NovoFine[®] Plus (PM-739-19)
- **Ozempic[®] 1 mg/dosis:** 1 lapicera prellenada de 3,0 ml con 4 agujas descartables NovoFine[®] Plus[®] (PM-739-19)

Tratamiento para la
diabetes tipo 2
Administración una
vez por semana

Titulación

Inicio

0,25 mg
por 4 semanas*

Aumente y/o mantenga

0,5 mg

por lo menos 4 semanas

Mantenga

0,5 mg o 1 mg

con base de control glucémico individual

*La dosis inicial de 0,25 mg no es una dosis de mantenimiento, es sólo para ayudar a los pacientes a la adaptación del tratamiento.

VER INFORMACIÓN
DE PRODUCTO.
Certificado N° 59.167



Diabetes

ANÁLOGO DE GLP1

VICTOZA®
liraglutida

**Presentación:**

Envase conteniendo
2 lapiceras x 3 ml.
Cada lapicera prellenada
contiene 18 mg de
liraglutida.

Tratamiento para la
diabetes tipo 2
Administración una
vez por día

Titulación

Inicio

0,6 mg
durante
una semana

1,2 mg

mantenimiento una vez al día

1,8 mg

para mejorar aún más el control
glucémico, si fuera necesario*

VER INFORMACIÓN
DE PRODUCTO.
Certificado N° 55.564



*Es de esperar que algunos pacientes se beneficien con un aumento de la dosis de 1,2 mg a 1,8 mg.

Diabetes

GLUCAGEN® HYPOKIT

**GlucaGen®
HypoKit**



1 vial con 1 mg de principio activo liofilizado
y 1 jeringa estéril prellenada con 1 ml de
agua para inyectables descartable

VER INFORMACIÓN
DE PRODUCTO.
Certificado N° 48.392.



Obesidad

ANÁLOGO DE GLP1

Saxenda[®]
liraglutida

**Presentación:**

Envase conteniendo
3 lapiceras x 3 ml.
Cada lapicera prellenada
contiene 18 mg de liraglutida.

Tratamiento para el sobrepeso y la obesidad

Inyección diaria
subcutánea

Titulación

SEMANA 1

0,6 mg

SEMANA 2

1,2 mg

SEMANA 3

1,8 mg

SEMANA 4

2,4 mg

SEMANA 5

3,0 mg*

Dosis de mantenimiento

*Corresponde a la dosificación máxima diaria

VER INFORMACIÓN
DE PRODUCTO.
Certificado N° 58.515



Dispositivos

NovoPen[®] 4

NovoPen Echo[®]

Dispositivos

NovoPen® 4

Puede administrar dosis de 1 U a 60 U en incrementos de 1 U.
Producto Médico aprobado por ANMAT PM-739-15



Capuchón

Siempre colóquelo para evitar que la insulina entre en contacto con la luz.

Contador de dosis

Úselo para ver la dosis seleccionada.

Botón pulsador

Gírelo para seleccionar la dosis.
Presiónelo para aplicar la dosis.

Indicador de dosis

Dispositivos

NovoPen Echo®

Puede administrar dosis de 0,5 U a 30 U en incrementos de media unidad (0,5 U).

Producto Médico aprobado por ANMAT PM-739-17



Cada segmento representa una hora desde la última inyección.


Número de unidades inyectadas en la última aplicación.

Capuchón

Siempre colóquelo para evitar que la insulina entre en contacto con la luz.

Contador de dosis

Úselo para ver la dosis seleccionada.



Indicador de dosis

Botón pulsador

Gírelo para seleccionar la dosis.
Presiónelo para aplicar la dosis.

Agujas

novofine®

NovoFine® 30G (0,3 x 8 mm)

Caja por 100 unidades

NovoFine® 32G (0,23/0,25 x 6 mm)

Caja por 100 unidades

NovoFine® 32G x 4 mm

Caja por 100 unidades



Producto Médico aprobado
por ANMAT: PM-739-7.

Novo Nordisk Pharma Argentina S.A.

Av. del Libertador 350 - Piso 3 (B1638BEP)

Vicente López - Prov. de Buenos Aires

Domingo de Acassuso 3780/90 - 1° Piso "A" (Noreste)

Olivos - Prov. de Buenos Aires

+54 11 5198 6686

Código QR

Si usted tiene dificultad con la lectura
del Código QR de cada producto,
contactarse con:

atencioncli@novonordisk.com

0800-345-NOVO (6686)