Regulatory Operations

Insert: 2010-508x462-062
LIFT - Current 3

Colour:
PMS 280C +
PMS 659C +
PMS Cool Grey 6C

OZEMPIC®
Semaglutida
0,25 mg; 0,50 mg/dosis
Solución inyectable en lapicera prellenada de 1,5 ml

INDUSTRIA DANESA **VENTA BAJO RECETA**

Lea atentamente todo el prospecto antes de comenzar a utilizar este medicamento, ya que contiene información importante para usted.
- Conserve este prospecto, ya que es posible que deba volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que podría perjudicarlos.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Vea la sección 4 *"Posibles efectos adversos"*.

Contenido del prospecto

1. ¿Qué es Ozempic® y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar Ozempic®?
3. ¿Cómo usar Ozempic®?
4. Posibles efectos adversos
5. ¿Cómo almacenar Ozempic®?
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿Qué es Ozempic® y para qué se utiliza?
Ozempic® contiene el principio activo semaglutida. Este es prescripto por el médico para disminuir el azúcar en sangre (glucosa) en adultos con diabetes tipo 2.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que:
- su cuerpo no produce suficiente insulina para regular el nivel de azúcar en sangre, o
- su cuerpo no puede utilizar la insulina que produce de manera adecuada.

Ozempic® se utiliza:
- solo, cuando la dieta y el ejercicio solos no son suficientes para controlar su nivel de azúcar en sangre y no puede utilizar metformina (otro medicamento para la diabetes), o
- con otros medicamentos para disminuir su nivel de azúcar en sangre.

Es importante que usted respete la dieta y el estilo de vida recomendados por su médico, farmacéutico o enfermero mientras utiliza Ozempic®.

2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar Ozempic®?
No utilice Ozempic® si:
- es alérgico a semaglutida o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6 *"Contenido del envase e información adicional"*).

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar Ozempic®:
- si tiene o ha tenido una enfermedad del páncreas;
- si tiene una enfermedad renal grave o si está realizándose diálisis;
- si tiene una enfermedad de tiroides, incluyendo nódulos y agrandamiento de la glándula tiroides;
- si utiliza una sulfonilurea o insulina para tratar su diabetes;
- si tiene diabetes tipo 1: su cuerpo no produce insulina;
- si tiene cetoacidosis diabética: una complicación de la diabetes que se produce cuando el cuerpo no puede degradar la glucosa porque no cuenta con suficiente insulina.

Dolor estomacal severo y persistente que podría deberse a pancreatitis aguda
Si usted sufre de dolor severo y persistente en el área del estómago, consulte a su médico de inmediato, ya que podría ser un signo de pancreatitis aguda (páncreas inflamado).

Deshidratación
Durante el tratamiento con Ozempic®, es posible que experimente náuseas, vómitos y diarrea. Estos efectos secundarios pueden causar deshidratación (pérdida de líquidos). Por lo tanto, es importante beber mucho líquido para prevenir la deshidratación. Si tiene alguna duda o inquietud, por favor consulte a su médico.

Enfermedad ocular diabética (retinopatía)
Las rápidas mejoras en el control de la glucosa en sangre podrían dar lugar a un empeoramiento temporal de la enfermedad ocular diabética, que podría requerir tratamiento o producir pérdida de visión. Debe informar a su médico si sufre de enfermedad ocular diabética (retinopatía) o si experimenta problemas oculares durante el tratamiento con Ozempic®.

Problemas renales
En personas con problemas renales, la diarrea, las náuseas y los vómitos pueden provocar pérdida de líquidos (deshidratación), lo que puede empeorar los problemas renales. Es importante beber líquidos para reducir el riesgo de deshidratación.
Informe a su médico o farmacéutico si:
- tiene alguna otra enfermedad,
- tiene alergias o
- está utilizando o aplicándose externamente otros medicamentos (incluso si los ha adquirido por su cuenta).

Niños y adolescentes
Ozempic® no debe ser utilizado en niños y adolescentes menores de 18 años, ya que aún no se han establecido la seguridad y la eficacia en este grupo de pacientes.

Embarazo y lactancia
Ozempic® no debe ser utilizado durante el embarazo, lactancia o como mínimo los dos meses anteriores a un embarazo planeado. Informe a su médico si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada. Si queda embarazada mientras utiliza este medicamento, consulte a su médico de inmediato, ya que su tratamiento deberá ser modificado. Este medicamento no debe ser utilizado durante el embarazo, debido a que se desconoce si puede afectar a su hijo por nacer. Por lo tanto, se recomienda utilizar métodos anticonceptivos mientras usa este medicamento.

Conducción y uso de máquinas
El bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia) puede afectar su capacidad de concentración. Evite conducir o utilizar máquinas si experimenta signos de bajo nivel de azúcar en sangre. Vea la sección 4 *"Posibles efectos adversos"* para consultar los signos de aviso de bajo nivel de azúcar en sangre. Por favor, para obtener más información, consulte a su médico.

Contenido de sodio
Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, por lo que es esencialmente "libre de sodio".

3. ¿Cómo usar Ozempic®?
Siempre use este medicamento exactamente como su médico se lo indicó. En caso de duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
Ozempic® 0,25 mg; 0,50 mg/dosis proporciona dosis de 0,25 mg y 0,50 mg.
- Cuando comience a usar Ozempic®, la dosis inicial es de 0,25 mg una vez por semana durante cuatro semanas.
- Después de las cuatro semanas, su médico puede aumentar la dosis a 0,50 mg una vez por semana.
- Después de otras cuatro semanas, su médico puede aumentarle la dosis a 1 mg una vez por semana si su nivel de azúcar en sangre no se encuentra bien controlado (reducido lo suficiente) con una dosis de 0,50 mg una vez por semana. En este caso, se encuentra disponible por separado una lapicera que proporciona dosis de 1 mg.

No cambie la dosis a menos que su médico se lo indique.

Cómo se administra Ozempic®
Ozempic® se administra como una inyección bajo la piel (inyección subcutánea). No inyecte el medicamento en una vena o un músculo.
- Los mejores lugares para administrar la inyección son la parte delantera del muslo, la parte delantera de la cintura (abdomen), o la parte superior del brazo.
- Antes de utilizar la lapicera por primera vez, su médico o enfermero le indicarán cómo usarla correctamente.

Junto a este prospecto se presentan instrucciones de uso detalladas.

Cuándo usar Ozempic®
- Debe utilizar Ozempic® una vez por semana, preferentemente siempre el mismo día de la semana.
- Puede administrarse la inyección a cualquier hora del día, independientemente de las comidas.

Como ayuda para recordar inyectarse Ozempic® sólo una vez por semana, se recomienda anotar el día de la semana elegido (por ejemplo, miércoles) en el envase.

En caso de ser necesario, puede cambiar el día de su inyección de Ozempic®, siempre que hayan transcurrido por lo menos 2 días desde su última inyección.

Si usa más Ozempic® del que debe
Si usa más Ozempic® del que debe, consulte a su médico de inmediato. Es posible que experimente efectos adversos tales como náuseas, vómitos o diarrea.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con un centro de toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Si olvida usar Ozempic®
Si olvidó inyectarse una dosis y:
- pasaron 5 días o menos desde que debería haber utilizado Ozempic®, administrese la inyección en cuanto lo recuerde. Luego administre la siguiente dosis como de costumbre, el día que tenga programado.
- pasaron más de 5 días desde que debería haber utilizado Ozempic®, no se administre la dosis olvidada. Administre la siguiente dosis como de costumbre, el día que tenga programado.

No se administre una dosis adicional ni aumente la dosis para compensar la dosis olvidada.

No deje de usar Ozempic® sin antes consultar a su médico. Si deja de usarlo, sus niveles de azúcar en sangre podrían aumentar.

No se ha establecido el uso y la seguridad de Ozempic® en niños menores de 18 años de edad.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

No cambie la dosis prescrita. Informe a su médico o farmacéutico si usted cree que el efecto del medicamento es demasiado débil o intenso.

4. Posibles efectos adversos
Este medicamento puede producir los siguientes efectos adversos:

Muy frecuentes (afectan a más de 1 de cada 10 personas)
- Náuseas: generalmente desaparecen con el tiempo.
- Diarrea: generalmente desaparece con el tiempo.
- Bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia) especialmente cuando Ozempic® se utiliza con medicamentos que contienen sulfonilurea o insulina. La hipoglucemia es frecuente cuando se combina con otros medicamentos usados para tratar la diabetes.

Los signos de aviso de niveles bajos de azúcar en sangre pueden aparecer repentinamente. Estos pueden incluir: sudor frío, piel pálida y fría, dolor de cabeza, latidos acelerados del corazón, sensación de náuseas o de mucho apetito, cambios en la visión, somnolencia o debilidad, nervios, ansiedad o confusión, dificultad para concentrarse y temblores.

Su médico le indicará cómo tratar los niveles bajos de azúcar en sangre y qué hacer si detecta alguno de estos signos de alerta.

Frecuentes (afectan de 1 a 10 personas de cada 100)
- Vómitos
- Indigestión
- Inflamación del estómago (gastritis): los signos incluyen dolor de estómago, náuseas y vómitos
- Reflujo o acidez, también denominado 'enfermedad por reflujo gastroesofágico' (ERGE)
- Dolor de estómago
- Distensión abdominal
- Constipación
- Eructos
- Cálculos en la vesícula biliar
- Mareos
- Cansancio
- Pérdida de peso
- Disminución del apetito
- Gases (flatulencias)
- Aumento de enzimas pancreáticas (como la lipasa y la amilasa en análisis de sangre)
- Complicaciones de la enfermedad ocular diabética (retinopatía diabética)

Poco frecuentes (afectan de 1 a 10 personas de cada 1.000)
- Cambios en el gusto de los alimentos y las bebidas
- Pulso acelerado
- Reacciones en el sitio de inyección, como moretones, dolor, irritación, picazón y erupciones.
- Inflamación del páncreas (pancreatitis aguda), que puede causar dolor persistente severo en el estómago y la zona de la espalda. Debe hablar con su médico de inmediato si experimenta estos síntomas.
- Reacciones alérgicas, como erupción cutánea, prurito o urticaria.
- Retraso en el vaciamiento del estómago
- Inflamación de la vesícula biliar

Raros (afectan de 1 a 10 personas de cada 10.000)
- Reacciones alérgicas graves (reacciones anafilácticas, angioedema). Debe buscar atención médica de urgencia e informar a su médico de inmediato si experimenta síntomas tales como dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta con dificultad para tragar, y latidos acelerados del corazón.

Frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)
- Obstrucción intestinal: una forma grave de estreñimiento con otros síntomas como dolor de estómago, hinchazón abdominal, vómitos, etc.

Si experimenta cualquier efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico. Esto incluye posibles efectos adversos que no estén listados en este prospecto.

5. ¿Cómo almacenar Ozempic®?
Mantenga este medicamento fuera del alcance y la vista de los niños.
No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que figura en el envase después de "Vence".
La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

Antes del uso:
Conservar en heladera (2°C – 8°C). No congelar. Mantener alejado del elemento refrigerador. Proteger de la luz.

Durante el uso:
Puede conservar la lapicera durante 6 semanas si se almacena a una temperatura inferior a 30°C o en heladera (2°C – 8°C), alejada del elemento refrigerador. No congelar.

Mientras no esté utilizando la lapicera, mantener el capuchón colocado para protegerla de la luz.

No utilice este medicamento si la solución no es transparente e incolora o casi incolora.

No debe tirar ningún medicamento por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que ya no utiliza. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Su médico o farmacéutico le brindará mayor información. Estas personas tienen información especializada detallada.

6. Contenido del envase e información adicional
Contenido de Ozempic® 0,25 mg; 0,50 mg/dosis
- El principio activo es semaglutida.
- Una lapicera prellenada contiene 2 mg de semaglutida (1,34 mg/ml).
- Los demás componentes son: fosfato disódico dihidrato, propilenglicol, fenol, ácido clorhídrico/hidróxido de sodio (para ajustar pH), agua para inyectables.

Aspecto de Ozempic® 0,25 mg; 0,50 mg/dosis y contenido del envase
Cada lapicera contiene 1,5 ml de solución y administra dosis de 0,25 mg o 0,50 mg.
Ozempic® 0,25 mg; 0,50 mg/dosis, solución inyectable en lapicera prellenada de 1,5 ml, está disponible en el siguiente tamaño de envase:
- 1 lapicera prellenada y 6 agujas NovoFine® Plus descartables.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: http://www.anmat.gob.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.
CERTIFICADO N° 59.167
Disposición N° 2303/26 (22-abr-2026)

Importado por:
Novo Nordisk Pharma Argentina S.A.
Domingo de Acassuso 3780/90, 1° Piso "A" (Noreste),
Olivos, Pcia. de Buenos Aires.
Director Técnico: Aldo A. Chiarelli – Farmacéutico.

Servicio de Atención al Cliente:
0800-345-NOVO (6686)
atencioncli@novonordisk.com

Elaborado por:
Novo Nordisk A/S
Novo Allé, 2880 Bagsvaerd / Brennum Park, 3400 Hillerod,
Dinamarca.

Acondicionado por:
Novo Nordisk A/S
Brennum Park, 3400 Hillerod,
Dinamarca.

Ozempic® y NovoFine® son marcas registradas propiedad de Novo Nordisk A/S, Dinamarca.

©2026
Novo Nordisk A/S

8-9558-55-001-9

OZEMPIC®
Semaglutida
Solución inyectable en lapicera prellenada de 1,5 ml

0,25 mg;
0,50 mg/dosis

novo nordisk®

NOTE:
QR code and above Text Box can be repositioned based on the text layout.

And this can be deleted if not in use.

8 mm
1 mm

Length: Max. 29 mm (100%)
Code: 100% Direction
Code centered

Instrucciones de uso de Ozempic® 0,25 mg; 0,50 mg/dosis, solución inyectable en lapicera prellenada de 1,5 ml

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su lapicera prellenada Ozempic®.
Hable con su médico, enfermero o farmacéutico sobre cómo inyectarse Ozempic® correctamente.
Empiece comprobando la lapicera para **asegurarse de que contiene Ozempic® 0,25 mg; 0,50 mg/dosis**. Luego observe las ilustraciones para familiarizarse con las distintas partes de la lapicera y la aguja.
Si es ciego o tiene visión reducida y no puede leer el contador de dosis de la lapicera, no utilice esta lapicera sin ayuda. Busque la ayuda de una persona que vea bien y sepa cómo usar la lapicera prellenada Ozempic®.
Ozempic® 0,25 mg; 0,50 mg/dosis contiene 2 mg de semaglutida. Puede seleccionar dosis de 0,25 mg o 0,50 mg.
Una lapicera sin usar contiene:
4 dosis de 0,25 mg (dosis inicial) y 2 dosis de 0,50 mg
o
4 dosis de 0,50 mg.
Utilice la tabla que se encuentra en el envase para anotar el día programado para la inyección (por ejemplo, miércoles) y para llevar un registro de la cantidad de inyecciones que se ha administrado y cuándo.
Su lapicera está diseñada para utilizarse con agujas descartables NovoFine® de hasta 8 mm de longitud.
Las agujas NovoFine® Plus están incluidas en el envase.


⚠ **Información importante**
Preste especial atención a estas notas porque son importantes para el uso seguro de la lapicera.

Lapicera prellenada Ozempic® y aguja (ejemplo)




1. Prepare su lapicera con una aguja nueva


- **Compruebe el nombre y el color de la etiqueta** de su lapicera para asegurarse de que contiene Ozempic® 0,25 mg; 0,50 mg/dosis. El uso de un medicamento equivocado puede ser perjudicial para su salud.
- **Retire el capuchón de la lapicera**.




- **Verifique que la solución de la lapicera sea transparente** e incolora. Mire a través de la ventana de la lapicera. Si la solución tiene un aspecto turbio, no utilice la lapicera.




- **Siempre utilice una aguja nueva para cada inyección.**
- **Tome una aguja nueva cuando esté listo para su inyección.** Revise la lengüeta de papel y la tapa externa de la aguja para detectar daños que pudieran afectar la esterilidad. Si se observa algún daño, utilice una aguja nueva.
- **Retire la lengüeta de papel.**




- **Asegúrese de colocar la aguja correctamente.**
- Coloque la aguja **recta** en la lapicera.
- Enrósquela hasta que quede **bien ajustada.**



- **La aguja está cubierta por dos tapas. Debe quitar ambas tapas.** No podrá inyectar la solución si olvida quitar las dos tapas.
- **Retire la tapa externa de la aguja y guárdela para más tarde.** La necesitará después de la inyección para retirar la aguja de la lapicera de forma segura.



- **Retire la tapa interna de la aguja y tírela.** Si intenta volver a colocarla, puede pincharse accidentalmente con la aguja.
- Puede aparecer una gota de solución en la punta de la aguja. Esto es normal, pero a pesar de ello debe comprobar el flujo si utiliza una lapicera nueva por primera vez. Consulte el paso 2 *"Compruebe el flujo con cada lapicera nueva"*.



⚠ **Utilice siempre una aguja nueva para cada inyección.**
Esto reduce el riesgo de bloqueo de las agujas, contaminación, infección y administración de una dosis incorrecta.

⚠ **Nunca utilice agujas dobladas o dañadas.**

2. Compruebe el flujo con cada lapicera nueva


- Si su lapicera ya está en uso, continúe con el paso 3, *"Seleccione la dosis"*.

Compruebe el flujo solo antes de su primera inyección con cada lapicera nueva. Gire el selector de dosis hasta que vea el símbolo de comprobación de flujo (••▰), **justo después del "0"**. Asegúrese de que el símbolo de comprobación de flujo quede alineado con el marcador de dosis.



- Sujete la lapicera con la aguja apuntando hacia arriba.

Presione y mantenga presionado el botón pulsador hasta que el contador de dosis vuelva a "0". El "0" debe quedar alineado con el marcador de dosis.
Debe aparecer una gota de solución en la punta de la aguja.



Es posible que quede una gota en la punta de la aguja, pero no se inyectará.
Si no aparece una gota, repita el paso 2 *"Compruebe el flujo con cada lapicera nueva"* hasta 6 veces. Si sigue sin aparecer una gota, cambie la aguja y repita el paso 2 *"Compruebe el flujo con cada lapicera nueva"* una vez más.
Si aún no aparece una gota, descarte la lapicera y utilice una nueva.

⚠ **Asegúrese siempre de que aparezca una gota** en la punta de la aguja antes de utilizar una lapicera nueva por primera vez. Esto asegura que la solución fluye.
Si no aparece una gota, **no** se inyectará medicamento, aunque el contador de dosis se mueva. **Esto puede indicar que la aguja está bloqueada o dañada.**
Si no comprueba el flujo antes de su primera inyección con cada lapicera nueva, es posible que no se administre la dosis prescrita y que Ozempic® 0,25 mg; 0,50 mg/dosis no produzca el efecto previsto.

3. Seleccione la dosis

- **Gire el selector de dosis hasta que el contador de dosis muestre la dosis prescrita ("0.25" para la dosis de 0,25 mg o "0.5" para la dosis de 0,50 mg).**

Si ha seleccionado una dosis incorrecta, puede girar el selector de dosis hacia adelante o hacia atrás para seleccionar la dosis correcta. Puede seleccionar hasta un máximo de 0,50 mg.




El selector de dosis cambia la dosis. Solamente el contador de dosis y el marcador de dosis mostrarán cuántos mg ha seleccionado por dosis.
Si su lapicera contiene menos de 0,50 mg, el contador de dosis se detiene antes de que aparezca "0.5".
El selector de dosis hace un "clic" diferente cuando se gira hacia adelante, hacia atrás o se pasa del número de mg que quedan.

⚠ **Antes de inyectarse este medicamento, utilice siempre el contador de dosis y el marcador de dosis para ver cuántos mg ha seleccionado.**
No cuente los "clics" de la lapicera.
Con el selector de dosis sólo deben seleccionarse dosis de 0,25 mg o 0,50 mg. La dosis seleccionada tiene que estar alineada de manera exacta con el marcador de dosis para asegurar que la dosis inyectada sea la correcta.

¿Cuánta solución queda?

- **Para ver cuánta solución queda exactamente,** utilice el contador de dosis: gire el selector de dosis hasta que el **contador de dosis se detenga.**


Si muestra "0.5" significa que quedan **al menos 0,50 mg** en su lapicera. Si el **contador de dosis se detiene antes de "0.5"**, significa que no queda suficiente solución para una dosis completa de 0,50 mg.




⚠ No use su lapicera si no queda suficiente solución para administrar una dosis completa. Use una nueva lapicera de Ozempic® 0,25 mg; 0,50 mg/dosis.

4. Inyéctese su dosis

- **Inserte la aguja bajo la piel** tal como le ha enseñado su médico o enfermero.
- **Asegúrese de que puede ver el contador de dosis.** No lo tape con los dedos. Esto podría interrumpir la inyección.




- **Presione y mantenga presionado el botón pulsador. Observe cómo el contador de dosis vuelve a "0".** El "0" debe quedar alineado con el marcador de dosis. Usted podrá entonces oír un "clic"
- **Continúe presionando el botón pulsador mientras mantiene la aguja en su piel.**



- **Cuente lentamente hasta 6 mientras mantiene presionado el botón pulsador.**
- Si retira antes la aguja, es posible que vea salir solución de la punta de la aguja. En ese caso, no se administrará la dosis completa.



- **Retire la aguja de su piel. Luego, puede soltar el botón pulsador.**
- Si aparece sangre en el lugar de la inyección, presione ligeramente.



Puede aparecer una gota de solución en la punta de la aguja después de la inyección. Esto es normal y no afecta su dosis.


⚠ **Observe siempre el contador de dosis para saber cuántos mg se inyecta.** Mantenga presionado el botón pulsador hasta que el contador de dosis indique "0".

¿Cómo identificar una aguja bloqueada o dañada?
- Si no aparece el "0" en el contador de dosis después de presionar continuamente el botón pulsador, puede que haya usado una aguja bloqueada o dañada.
- En este caso, **no habrá recibido nada** de medicamento, a pesar de que el contador de dosis se haya movido de la dosis original que usted había seleccionado.


¿Qué hacer si la aguja está bloqueada?
Cambie la aguja tal como se describe en el paso 5 *"Después de la inyección"*, y repita todos los pasos desde el paso 1 *"Prepare su lapicera con una aguja nueva"*.

5. Después de la inyección


- **Descarte siempre la aguja después de cada inyección.** Esto ayuda a evitar el bloqueo de las agujas, contaminaciones, infecciones, pérdida de solución y dosis incorrectas.
- **Introduzca la punta de la aguja** en su tapa externa sobre una superficie plana, sin tocar la aguja ni la tapa externa de la aguja.



- Una vez que la aguja esté cubierta, **presione completamente y con cuidado la tapa externa de la aguja.**
- **Desenrosque la aguja** y descártela.



- **Coloque el capuchón en su lapicera** después de cada uso para proteger la solución de la luz.



Cuando la lapicera esté vacía, deséchela **sin** una aguja colocada, siguiendo las instrucciones de su médico, enfermero o farmacéutico.

⚠ Información importante adicional

- **Nunca comparta** su lapicera o las agujas con otras personas.
- Las personas que atienden a los pacientes **deben tener mucho cuidado cuando manipulan agujas usadas** para evitar lesiones provocadas por las agujas y la transmisión de infecciones.

Cuidados de la lapicera

Trate a su lapicera con cuidado. La manipulación brusca o el mal uso pueden causar dosificación incorrecta. Si esto ocurre, es posible que no logre el efecto previsto de este medicamento.

- **No exponga su lapicera al polvo, suciedad o líquidos.**
- **No lave, remoje o lubrique su lapicera.** Puede limpiarla con un paño humedecido con un detergente suave.
- **No deje caer su lapicera** ni la golpee contra superficies duras. En caso de caída o si sospecha un problema, coloque una aguja nueva y compruebe el flujo antes de inyectarse.
- **No trate de reparar su lapicera** o desarmarla.

Regulatory Operations

Insert: 2010-508x462-082
LIFT - Current 3

Colour:
PMS 280C +
PMS 659C +
PMS Cool Gray 6C

OZEMPIC®
Semaglutida
1 mg/dosis
Solución inyectable en lapicera prellenada de 3,0 ml

INDUSTRIA DANESA **VENTA BAJO RECETA**

Lea atentamente todo el prospecto antes de comenzar a utilizar este medicamento, ya que contiene información importante para usted.
- Conserve este prospecto, ya que es posible que deba volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que podría perjudicarlos.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Vea la sección 4 "*Posibles efectos adversos*".

Contenido del prospecto

1. ¿Qué es Ozempic® y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar Ozempic®?
3. ¿Cómo usar Ozempic®?
4. Posibles efectos adversos
5. ¿Cómo almacenar Ozempic®?
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿Qué es Ozempic® y para qué se utiliza?
Ozempic® contiene el principio activo semaglutida. Este es prescripto por el médico para disminuir el azúcar en sangre (glucosa) en adultos con diabetes tipo 2.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que:
- su cuerpo no produce suficiente insulina para regular el nivel de azúcar en sangre, o
- su cuerpo no puede utilizar la insulina que produce de manera adecuada.

Ozempic® se utiliza:
- solo, cuando la dieta y el ejercicio solos no son suficientes para controlar su nivel de azúcar en sangre, y no puede utilizar metformina (otro medicamento para la diabetes), o
- con otros medicamentos para disminuir su nivel de azúcar en sangre.

Es importante que usted respete la dieta y el estilo de vida recomendados por su médico, farmacéutico o enfermero mientras utiliza Ozempic®.

2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar Ozempic®?
No utilice Ozempic® si:
- es alérgico a semaglutida o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6 "*Contenido del envase e información adicional*").

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar Ozempic®:
- si tiene o ha tenido una enfermedad del páncreas;
- si tiene una enfermedad renal grave o si está realizándose diálisis;
- si tiene una enfermedad de tiroides, incluyendo nódulos y agrandamiento de la glándula tiroides;
- si utiliza una sulfonilurea o insulina para tratar su diabetes;
- si tiene diabetes tipo 1: su cuerpo no produce insulina;
- si tiene cetoacidosis diabética: una complicación de la diabetes que se produce cuando el cuerpo no puede degradar la glucosa porque no cuenta con suficiente insulina.

Dolor estomacal severo y persistente que podría deberse a pancreatitis aguda
Si usted sufre de dolor severo y persistente en el área del estómago, consulte a su médico de inmediato, ya que podría ser un signo de pancreatitis aguda (páncreas inflamado).

Deshidratación
Durante el tratamiento con Ozempic®, es posible que experimente náuseas, vómitos y diarrea. Estos efectos secundarios pueden causar deshidratación (pérdida de líquidos). Por lo tanto, es importante beber mucho líquido para prevenir la deshidratación. Si tiene alguna duda o inquietud, por favor consulte a su médico.

Enfermedad ocular diabética (retinopatía)
Las rápidas mejoras en el control de la glucosa en sangre podrían dar lugar a un empeoramiento temporal de la enfermedad ocular diabética que podría requerir tratamiento o producir pérdida de visión. Debe informar a su médico si sufre de enfermedad ocular diabética (retinopatía) o si experimenta problemas oculares durante el tratamiento con Ozempic®.

Problemas renales
En personas con problemas renales, la diarrea, las náuseas y los vómitos pueden provocar pérdida de líquidos (deshidratación), lo que puede empeorar los problemas renales. Es importante beber líquidos para reducir el riesgo de deshidratación.

Informe a su médico o farmacéutico si:
- tiene alguna otra enfermedad,
- tiene alergias o
- está utilizando o aplicándose externamente otros medicamentos (incluso si los ha adquirido por su cuenta).

Niños y adolescentes
Ozempic® no debe ser utilizado en niños y adolescentes menores de 18 años, ya que aún no se han establecido la seguridad y la eficacia en este grupo de pacientes.

Embarazo y lactancia
Ozempic® no debe ser utilizado durante el embarazo, lactancia o como mínimo los dos meses anteriores a un embarazo planeado. Informe a su médico si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada. Si queda embarazada mientras utiliza este medicamento, consulte a su médico de inmediato, ya que su tratamiento deberá ser modificado. Este medicamento no debe ser utilizado durante el embarazo, debido a que se desconoce si puede afectar a su hijo por nacer. Por lo tanto, se recomienda utilizar métodos anticonceptivos mientras usa este medicamento.

Conducción y uso de máquinas
El bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia) puede afectar su capacidad de concentración. Evite conducir o utilizar máquinas si experimenta signos de bajo nivel de azúcar en sangre. Vea la sección 4 "*Posibles efectos adversos*" para consultar los signos de aviso de bajo nivel de azúcar en sangre. Por favor, para obtener más información, consulte a su médico.

Contenido de sodio
Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, por lo que es esencialmente "libre de sodio".

3. ¿Cómo usar Ozempic®?
Siempre use este medicamento exactamente como su médico se lo indicó. En caso de duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Ozempic® 1 mg/dosis proporciona dosis de 1 mg.

Cómo se administra Ozempic®
Ozempic® se administra como una inyección bajo la piel (inyección subcutánea). No inyecte el medicamento en una vena o un músculo.
- Los mejores lugares para administrar la inyección son la parte delantera del muslo, la parte delantera de la cintura (abdomen), o la parte superior del brazo.
- Antes de utilizar la lapicera por primera vez, su médico o enfermero le indicarán cómo usarla correctamente.

Junto a este prospecto se presentan instrucciones de uso detalladas.

Cuándo usar Ozempic®
- Debe utilizar Ozempic® una vez por semana, preferentemente siempre el mismo día de la semana.
- Puede administrarse la inyección a cualquier hora del día, independientemente de las comidas.

Como ayuda para recordar inyectarse Ozempic® sólo una vez por semana, se recomienda anotar el día de la semana elegido (por ejemplo, miércoles) en el envase.

En caso de ser necesario, puede cambiar el día de su inyección de Ozempic®, siempre que hayan transcurrido por lo menos 2 días desde su última inyección.

Si usa más Ozempic® del que debe
Si usa más Ozempic® del que debe, consulte a su médico de inmediato. Es posible que experimente efectos adversos tales como náuseas, vómitos o diarrea.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con un centro de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Si olvida usar Ozempic®
Si olvidó inyectarse una dosis y:
- pasaron 5 días o menos desde que debería haber utilizado Ozempic®, administrese la inyección en cuanto lo recuerde. Luego administre la siguiente dosis como de costumbre, el día que tenga programado.
- pasaron más de 5 días desde que debería haber utilizado Ozempic®, no se administre la dosis olvidada. Administre la siguiente dosis como de costumbre, el día que tenga programado.

No se administre una dosis adicional ni aumente la dosis para compensar la dosis olvidada.

No deje de usar Ozempic® sin antes consultar a su médico. Si deja de usarlo, sus niveles de azúcar en sangre podrían aumentar.

No se ha establecido el uso y la seguridad de Ozempic® en niños menores de 18 años de edad.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

No cambie la dosis prescrita. Informe a su médico o farmacéutico si usted cree que el efecto del medicamento es demasiado débil o intenso.

4. Posibles efectos adversos
Este medicamento puede producir los siguientes efectos adversos:

Muy frecuentes (afectan a más de 1 de cada 10 personas)
- Náuseas: generalmente desaparecen con el tiempo.
- Diarrea: generalmente desaparece con el tiempo.
- Bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia) especialmente cuando Ozempic® se utiliza con medicamentos que contienen sulfonilurea o insulina. La hipoglucemia es frecuente cuando se combina con otros medicamentos usados para tratar la diabetes.

Los signos de aviso de niveles bajos de azúcar en sangre pueden aparecer repentinamente. Estos pueden incluir: sudor frío, piel pálida y fría, dolor de cabeza, latidos acelerados del corazón, sensación de náuseas o de mucho apetito, cambios en la visión, somnolencia o debilidad, nervios, ansiedad o confusión, dificultad para concentrarse y temblores.

Su médico le indicará cómo tratar los niveles bajos de azúcar en sangre y qué hacer si detecta alguno de estos signos de alerta.

Frecuentes (afectan de 1 a 10 personas de cada 100)
- Vómitos
- Indigestión
- Inflamación del estómago (gastritis): los signos incluyen dolor de estómago, náuseas y vómitos
- Reflujo o acidez, también denominado 'enfermedad por reflujo gastroesofágico' (ERGE)
- Dolor de estómago
- Distensión abdominal
- Constipación
- Eructos
- Cálculos en la vesícula biliar
- Mareos
- Cansancio
- Pérdida de peso
- Disminución del apetito
- Gases (flatulencias)
- Aumento de enzimas pancreáticas (como la lipasa y la amilasa en análisis de sangre)
- Complicaciones de la enfermedad ocular diabética (retinopatía diabética)

Poco frecuentes (afectan de 1 a 10 personas de cada 1.000)
- Cambios en el gusto de los alimentos y las bebidas
- Pulso acelerado
- Reacciones en el sitio de inyección, como moretones, dolor, irritación, picazón y erupciones
- Inflamación del páncreas (pancreatitis aguda), que puede causar dolor persistente severo en el estómago y la zona de la espalda. Debe hablar con su médico de inmediato si experimenta estos síntomas.
- Reacciones alérgicas, como erupción cutánea, prurito o urticaria.
- Retraso en el vaciamiento del estómago
- Inflamación de la vesícula biliar

Raros (afectan de 1 a 10 personas de cada 10.000)
- Reacciones alérgicas graves (reacciones anafilácticas, angioedema). Debe buscar atención médica de urgencia e informar a su médico de inmediato si experimenta síntomas tales como dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta con dificultad para tragar, y latidos acelerados del corazón.

Frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)
- Obstrucción intestinal: una forma grave de estreñimiento con otros síntomas como dolor de estómago, hinchazón abdominal, vómitos, etc.

Si experimenta cualquier efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico. Esto incluye posibles efectos adversos que no estén listados en este prospecto.

5. ¿Cómo almacenar Ozempic®?
Mantenga este medicamento fuera del alcance y la vista de los niños.
No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que figura en el envase después de "Vence".
La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

Antes del uso:
Conservar en heladera (2°C – 8°C). No congelar. Mantener alejado del elemento refrigerador. Proteger de la luz.

Durante el uso:
Puede conservar la lapicera durante 6 semanas si se almacena a una temperatura inferior a 30°C o en heladera (2°C – 8°C), alejada del elemento refrigerador. No congelar.

Mientras no esté utilizando la lapicera, mantener el capuchón colocado para protegerla de la luz.

No utilice este medicamento si la solución no es transparente e incolora o casi incolora.

No debe tirar ningún medicamento por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que ya no utiliza. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Su médico o farmacéutico le brindará mayor información. Estas personas tienen información especializada detallada.

6. Contenido del envase e información adicional
Contenido de Ozempic® 1 mg/dosis
- El principio activo es semaglutida.
- Una lapicera prellenada contiene 4 mg de semaglutida (1,34 mg/ml).
- Los demás componentes son: fosfato disódico dihidrato, propilenglicol, fenol, ácido clorhídrico/hidróxido de sodio (para ajustar pH), agua para inyectables.

Aspecto de Ozempic® 1 mg/dosis y contenido del envase
Cada lapicera contiene 3,0 ml de solución y administra 4 dosis de 1 mg.
Ozempic® 1 mg/dosis, solución inyectable en lapicera prellenada de 3,0 ml, está disponible en el siguiente tamaño de envase:
- 1 lapicera prellenada y 4 agujas NovoFine® Plus descartables.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: http://www.anmat.gob.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.
CERTIFICADO N° 59.167
Disposición N° 2303/26 (22-abr-2026)

Importado por:
Novo Nordisk Pharma Argentina S.A.
Domingo de Acassuso 3780/90, 1° Piso "A" (Noreste),
Olivos, Pcia. de Buenos Aires.
Director Técnico: Aldo A. Chiarelli – Farmacéutico.

Servicio de Atención al Cliente:
0800-345-NOVO (6686)
atencioncli@novonordisk.com

Elaborado por:
Novo Nordisk A/S
Novo Allé, 2880 Bagsvaerd / Brennum Park, 3400 Hillerod, Dinamarca.

Acondicionado por:
Novo Nordisk A/S
Brennum Park, 3400 Hillerod,
Dinamarca.

Ozempic® y NovoFine® son marcas registradas propiedad de Novo Nordisk A/S, Dinamarca.

©2026
Novo Nordisk A/S

8-9514-55-020-8

Length: Max. 29 mm (100%)
Code: 100% Direction →
Code centered

OZEMPIC®
Semaglutida
Solución inyectable en lapicera prellenada de 3,0 ml

1 mg/dosis

novo nordisk®

NOTE:
QR code and above Text Box can be repositioned based on the text layout.

And this can be deleted if not in use.


8 mm
1 mm

Instrucciones de uso de Ozempic® 1 mg/dosis, solución inyectable en lapicera prellenada de 3,0 ml

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su lapicera prellenada Ozempic®.
Hable con su médico, enfermero o farmacéutico sobre cómo inyectarse Ozempic® correctamente.
Empiece comprobando la lapicera para **asegurarse de que contiene Ozempic® 1 mg/dosis**. Luego observe las ilustraciones para familiarizarse con las distintas partes de la lapicera y la aguja.
Si es ciego o tiene visión reducida y no puede leer el contador de dosis de la lapicera, no utilice esta lapicera sin ayuda. Busque la ayuda de una persona que vea bien y sepa cómo usar la lapicera prellenada Ozempic®.
Ozempic® 1 mg/dosis en lapicera prellenada de 3,0 ml contiene 4 mg de semaglutida. Puede seleccionar dosis de 1 mg.
Una lapicera sin usar contiene 4 dosis de 1 mg.
Utilice la tabla que se encuentra en el envase para anotar el día programado para la inyección (por ejemplo, miércoles).
Su lapicera está diseñada para utilizarse con agujas descartables NovoFine® de hasta 8 mm de longitud.
Las agujas NovoFine® Plus están incluidas en el envase.


⚠ **Información importante**
Preste especial atención a estas notas porque son importantes para el uso seguro de la lapicera.

Lapicera prellenada Ozempic® y aguja (ejemplo)




1. Prepare su lapicera con una aguja nueva


- **Compruebe el nombre y el color de la etiqueta** de su lapicera para asegurarse de que contiene Ozempic® 1 mg/dosis. El uso de un medicamento equivocado puede ser perjudicial para su salud.
- **Retire el capuchón de la lapicera**.




- **Verifique que la solución de la lapicera sea transparente** e incolora. Mire a través de la ventana de inspección de la lapicera. Si la solución tiene un aspecto turbio, no utilice la lapicera.




- **Siempre utilice una aguja nueva para cada inyección.**
- **Tome una aguja nueva cuando esté listo para su inyección.** Revise la lengüeta de papel y la tapa externa de la aguja para detectar daños que pudieran afectar la esterilidad. Si se observa algún daño, utilice una aguja nueva.
- **Retire la lengüeta de papel.**




- **Asegúrese de colocar la aguja correctamente.**
- Coloque la aguja **recta** en la lapicera.
- Enrósquela hasta que quede **bien ajustada.**



- **La aguja está cubierta por dos tapas. Debe quitar ambas tapas.** No podrá inyectar la solución si olvida quitar las dos tapas.
- **Retire la tapa externa de la aguja y guárdela para más tarde.** La necesitará después de la inyección para retirar la aguja de la lapicera de forma segura.



- **Retire la tapa interna de la aguja y tírela.** Si intenta volver a colocarla, puede pincharse accidentalmente con la aguja.
- Puede aparecer una gota de solución en la punta de la aguja. Esto es normal, pero a pesar de ello debe comprobar el flujo si utiliza una lapicera nueva por primera vez. Consulte el paso 2 *"Compruebe el flujo con cada lapicera nueva"*.



⚠ **Utilice siempre una aguja nueva para cada inyección.**
Esto reduce el riesgo de bloqueo de las agujas, contaminación, infección y administración de una dosis incorrecta.


⚠ **Nunca utilice agujas dobladas o dañadas.**

2. Compruebe el flujo con cada lapicera nueva

- Si su lapicera ya está en uso, continúe con el paso 3, *"Seleccione la dosis"*.
  Compruebe el flujo solo antes de su primera inyección con cada lapicera nueva.
- Gire el selector de dosis hasta que vea el símbolo de comprobación de flujo (••), **justo después del "0"**. Asegúrese de que el símbolo de comprobación de flujo quede alineado con el marcador de dosis.



- Sujete la lapicera con la aguja apuntando hacia arriba.
  Presione y mantenga presionado el botón pulsador hasta que el contador de dosis vuelva a "0". El "0" debe quedar alineado con el marcador de dosis.
  Debe aparecer una gota de solución en la punta de la aguja.



Es posible que quede una gota en la punta de la aguja, pero no se inyectará.
Si no aparece una gota, repita el paso 2 *"Compruebe el flujo con cada lapicera nueva"* hasta 6 veces. Si sigue sin aparecer una gota, cambie la aguja y repita el paso 2 *"Compruebe el flujo con cada lapicera nueva"* una vez más.
Si aún no aparece una gota, descarte la lapicera y utilice una nueva.

⚠ **Asegúrese siempre de que aparezca una gota** en la punta de la aguja antes de utilizar una lapicera nueva por primera vez. Esto asegura que la solución fluye.
Si no aparece una gota, **no** se inyectará medicamento, aunque el contador de dosis se mueva. **Esto puede indicar que la aguja está bloqueada o dañada.**
Si no comprueba el flujo antes de su primera inyección con cada lapicera nueva, es posible que no se administre la dosis prescrita y que Ozempic® 1 mg/dosis no produzca el efecto previsto.

3. Seleccione la dosis

- **Gire el selector de dosis para seleccionar 1 mg.**
  Siga girando **hasta que el contador de dosis** se detenga e **indique 1 mg.**




Solamente el contador de dosis y el marcador de dosis mostrarán que se ha seleccionado 1 mg.
Puede seleccionar únicamente 1 mg por dosis. Si su lapicera contiene menos de 1 mg, el contador de dosis se detiene antes de que aparezca "1".
El selector de dosis hace un "clic" diferente cuando se gira hacia adelante, hacia atrás o se pasa de 1 mg.

⚠ **Antes de inyectarse este medicamento, utilice siempre el contador de dosis y el marcador de dosis para ver que se haya seleccionado 1 mg.**
No cuente los "clics" de la lapicera.
Con el selector de dosis sólo deben seleccionarse dosis de 1 mg. El "1" tiene que estar alineado de manera exacta con el marcador de dosis para asegurar que la dosis inyectada sea la correcta.

¿Cuánta solución queda?


- **Para ver cuánta solución queda exactamente,** utilice el contador de dosis: gire el selector de dosis hasta que el **contador de dosis se detenga.**
- Si muestra "1" significa que queda **al menos 1 mg** en su lapicera. Si el **contador de dosis se detiene antes del "1"**, significa que no queda suficiente solución para una dosis completa de 1 mg.




⚠ No use su lapicera si no queda suficiente solución para administrar una dosis completa. Use una nueva lapicera de Ozempic® 1 mg/dosis.

4. Inyéctese su dosis

- **Inserte la aguja bajo la piel** tal como le ha enseñado su médico o enfermero.
- **Asegúrese de que puede ver el contador de dosis.** No lo tape con los dedos. Esto podría interrumpir la inyección.




- **Presione y mantenga presionado el botón pulsador. Observe cómo el contador de dosis vuelve a "0".** El "0" debe quedar alineado con el marcador de dosis. Usted podrá entonces oír un "clic"
- **Continúe presionando el botón pulsador mientras mantiene la aguja en su piel.**



- **Cuente lentamente hasta 6 mientras mantiene presionado el botón pulsador.**
- Si retira antes la aguja, es posible que vea salir solución de la punta de la aguja. En ese caso, no se administrará la dosis completa.



- **Retire la aguja de su piel. Luego, puede soltar el botón pulsador.**
- Si aparece sangre en el lugar de la inyección, presione ligeramente.



Puede aparecer una gota de solución en la punta de la aguja después de la inyección. Esto es normal y no afecta su dosis.


⚠ **Observe siempre el contador de dosis para saber cuántos mg se inyecta.** Mantenga presionado el botón pulsador hasta que el contador de dosis indique "0".

¿Cómo identificar una aguja bloqueada o dañada?
- Si no aparece el "0" en el contador de dosis después de presionar continuamente el botón pulsador, puede que haya usado una aguja bloqueada o dañada.
- En este caso, **no habrá recibido nada** de medicamento, a pesar de que el contador de dosis se haya movido de la dosis original que usted había seleccionado.


¿Qué hacer si la aguja está bloqueada?
Cambie la aguja tal como se describe en el paso 5 *"Después de la inyección"*, y repita todos los pasos desde el paso 1 *"Prepare su lapicera con una aguja nueva"*.

5. Después de la inyección


- **Descarte siempre la aguja después de cada inyección.** Esto ayuda a evitar el bloqueo de las agujas, contaminaciones, infecciones, pérdida de solución y dosis incorrectas.
- **Introduzca la punta de la aguja en su tapa externa** sobre una superficie plana, sin tocar la aguja ni la tapa externa de la aguja.



- Una vez que la aguja esté cubierta, **presione completamente y con cuidado la tapa externa de la aguja.**
- **Desenrosque la aguja** y descártela.



- **Coloque el capuchón** en su lapicera después de cada uso para proteger la solución de la luz.



Cuando la lapicera esté vacía, deséchela **sin** una aguja colocada, siguiendo las instrucciones de su médico, enfermero o farmacéutico.

⚠ Información importante adicional

- **Nunca comparta** su lapicera o las agujas con otras personas.
- Las personas que atienden a los pacientes **deben tener mucho cuidado cuando manipulan agujas usadas** para evitar lesiones provocadas por las agujas y la transmisión de infecciones.

Cuidados de la lapicera

Trate a su lapicera con cuidado. La manipulación brusca o el mal uso pueden causar dosificación incorrecta. Si esto ocurre, es posible que no logre el efecto previsto de este medicamento.

- **No exponga su lapicera al polvo, suciedad o líquidos.**
- **No lave, remoje o lubrique su lapicera.** Puede limpiarla con un paño humedecido con un detergente suave.
- **No deje caer su lapicera** ni la golpee contra superficies duras. En caso de caída o si sospecha un problema, coloque una aguja nueva y compruebe el flujo antes de inyectarse.
- **No trate de reparar su lapicera** o desarmarla.