Regulatory Operations

Insert:
2010-508x462-025
LIFT - Current 2

Patient

Colour:
PMS 280C +
PMS 659C +
PMS Violet C

Saxenda®

Liraglutida 6 mg/ml

Solución inyectable en lapicera prellenada

VENTA BAJO RECETA **INDUSTRIA DANESA**

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento porque contiene información importante para usted.
- Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted ya que puede perjudicarlos.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de algún posible efecto adverso que no aparece en este prospecto. Ver sección *4. Posibles efectos adversos*.

Contenido del prospecto

1. ¿Qué es Saxenda® y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar Saxenda®?
3. ¿Cómo usar Saxenda®?
4. Posibles efectos adversos
5. ¿Cómo conservar Saxenda®?
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿Qué es Saxenda® y para qué se utiliza?

¿Qué es Saxenda®?
Saxenda® es un medicamento para perder peso que contiene el principio activo liraglutida. Es similar a una hormona de origen natural llamada péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) que se libera en el intestino después de comer. Saxenda® actúa sobre los receptores del cerebro que controlan el apetito, haciéndolo sentir más satisfecho y con menos hambre. De esta forma, puede ayudarlo a comer menos y reducir su peso corporal.

¿Para qué se utiliza Saxenda®?
Saxenda® se utiliza para perder peso junto a una dieta adecuada y la realización de ejercicio en adultos de más de 18 años con
- un IMC de 30 kg/m^2 o superior (obesidad) o
- un IMC de 27 kg/m^2 a menor de 30 kg/m^2 (sobrepeso) y problemas de salud relacionados con el peso (como diabetes, presión arterial alta, niveles anormales de grasas en sangre o problemas respiratorios durante el sueño denominados "apnea obstructiva del sueño").

El IMC (índice de masa corporal) es una medida de su peso en relación con su altura.

Sólo debe seguir utilizando Saxenda® si ha perdido al menos el 5% de su peso corporal inicial después de 12 semanas de tratamiento con una dosis diaria de 3,0 mg (ver sección 3. *¿Cómo usar Saxenda®?*). Consulte a su médico antes de continuar.

Saxenda® puede ser utilizado en combinación con una nutrición saludable y mayor actividad física para el control del peso en adolescentes a partir de 12 años de edad con:
- obesidad (diagnosticada por su médico)
- peso corporal superior a 60 kg

Sólo debe seguir utilizando Saxenda® si ha perdido al menos el 4% de su IMC después de 12 semanas de tratamiento con una dosis diaria de 3,0 mg o la dosis máxima tolerada (ver sección 3. *¿Cómo usar Saxenda®?*). Consulte a su médico antes de continuar.

Dieta y ejercicio
Su médico le indicará comenzar con una dieta y con un programa de ejercicios que deberá mantener mientras esté en tratamiento con Saxenda®.

2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar Saxenda®?

No use Saxenda®:
- si es alérgico a liraglutida o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6. *Contenido del envase e información adicional*).

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Saxenda®.

El uso de Saxenda® no se recomienda si padece insuficiencia cardíaca grave.

Hay poca experiencia con este medicamento en pacientes de 75 años en adelante. No está recomendado si tiene 75 años o más.

Hay poca experiencia con este medicamento en pacientes con problemas renales. Si padece una enfermedad renal o está en diálisis, consulte a su médico.

Hay poca experiencia con este medicamento en pacientes con problemas de hígado. Si tiene problemas de hígado, consulte a su médico.

No se recomienda este medicamento si tiene un problema grave de estómago o de intestino que produzca un retraso del vaciamiento del estómago (llamado gastroparesia), o si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal.

Si sabe que le realizarán una intervención quirúrgica en la que se someterá a anestesia, informe a su médico que está utilizando Saxenda®.

Personas con diabetes
Si tiene diabetes, no utilice Saxenda® como sustituto de la insulina.

Inflamación del páncreas
Consulte a su médico si tiene o ha tenido una enfermedad del páncreas.

Inflamación de la vesícula y cálculos biliares
Si pierde mucho peso, corre el riesgo de desarrollar cálculos biliares y como consecuencia, inflamación de la vesícula. Deje de utilizar Saxenda® y contacte a su médico inmediatamente si experimenta dolor intenso en la parte superior del abdomen, generalmente peor en el lado derecho debajo de las costillas. El dolor se puede sentir hasta la espalda o el hombro derecho. Ver sección 4. *Posibles efectos adversos*.

Enfermedad tiroidea
Consulte a su médico si tiene enfermedad tiroidea, incluyendo nódulos tiroideos y agrandamiento de la glándula tiroidea.

Frecuencia cardíaca
Consulte a su médico si tiene palpitaciones (es consciente del latido de su corazón) o si tiene una sensación de aceleración del pulso en reposo durante el tratamiento con Saxenda®.

Pérdida de líquidos y deshidratación
Al iniciar el tratamiento con Saxenda®, es posible que pierda líquidos o se deshidrate. Esto puede deberse a sentir malestar (náuseas), estar descompuesto (vómitos) y tener diarrea. Es importante evitar la deshidratación bebiendo mucho líquido. Si tiene alguna duda o pregunta, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Ver sección 4. *Posibles efectos adversos*.

Niños y adolescentes
La seguridad y la eficacia de Saxenda® en niños menores de 12 años no se han estudiado.

Uso de Saxenda® con otros medicamentos
Informe a su médico, farmacéutico o enfermero si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

En particular, informe a su médico, farmacéutico o enfermero si:
- toma medicamentos para la diabetes llamados "sulfonilureas" (como glimepirida o glibenclamida) o si se está administrando insulina - su nivel de azúcar en sangre puede bajar (hipoglucemia) si utiliza estos medicamentos con Saxenda®. Su médico puede ajustar la dosis de su medicación para la diabetes para prevenir episodios de hipoglucemia. Ver sección 4. *Posibles efectos adversos*, para consultar los síntomas de aviso de un descenso de azúcar en sangre. Si ajusta su dosis de insulina, su médico le puede recomendar controlar su nivel de azúcar en sangre de manera más frecuente.
- toma warfarina u otros medicamentos por vía oral que reducen la coagulación de la sangre (anticoagulantes). Pueden ser necesarios análisis de sangre más frecuentes para determinar la capacidad de coagulación de su sangre.

Embarazo y lactancia
No use Saxenda® si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, porque se desconoce si Saxenda® puede afectar al feto.

No amamante a su bebé si está usando Saxenda®, ya que se desconoce si Saxenda® se excreta en la leche materna.

Conducción y uso de máquinas
Es poco probable que Saxenda® afecte a su capacidad para conducir y utilizar máquinas.
Algunos pacientes pueden sentir mareos cuando utilizan Saxenda® principalmente durante los 3 primeros meses de tratamiento (ver sección *4. Posibles efectos adversos*). Si siente mareos, tenga mucho cuidado al conducir o utilizar máquinas. Si necesita más información, consulte a su médico.

Información importante sobre alguno de los componentes de Saxenda®
Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis; esto es, esencialmente "libre de sodio".

3. ¿Cómo usar Saxenda®?

Siempre siga exactamente las instrucciones de administración de Saxenda® indicadas por su médico. En caso de duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.

Su médico le indicará realizar una dieta y un programa de ejercicios que deberá mantener mientras esté en tratamiento con Saxenda®.

¿Cuánto inyectarse?

Adultos
El tratamiento se iniciará con una dosis baja que aumentará gradualmente durante las cinco primeras semanas de tratamiento.
- Cuando comience a utilizar Saxenda®, la dosis inicial es de 0,6 mg una vez al día, durante al menos una semana.
- Su médico le indicará que aumente gradualmente la dosis, por lo general 0,6 mg cada semana, hasta llegar a la dosis recomendada de 3,0 mg una vez al día.

Su médico le indicará la cantidad de Saxenda® que debe utilizar cada semana. Normalmente, se le indicará que siga la siguiente tabla.

Semana	Dosis inyectada
Semana 1	0,6 mg una vez al día
Semana 2	1,2 mg una vez al día
Semana 3	1,8 mg una vez al día
Semana 4	2,4 mg una vez al día
Semana 5 en adelante	3,0 mg una vez al día

Una vez alcanzada la dosis recomendada de 3,0 mg en la semana 5 de tratamiento, siga utilizando esta dosis hasta que finalice el período de tratamiento. No aumente más la dosis.

Su médico evaluará el tratamiento de forma periódica.

Adolescentes (≥12 años)
Para adolescentes de 12 a menos de 18 años de edad se debe aplicar un esquema de aumento gradual de dosis similar al de los adultos (vea la tabla anterior para adultos). La dosis debe aumentarse hasta alcanzar los 3,0 mg (dosis de mantenimiento) o la dosis máxima tolerada. No se recomiendan dosis diarias mayores a 3,0 mg.

¿Cómo y cuándo utilizar Saxenda®?
- Antes de utilizar la lapicera por primera vez, su médico o enfermero le mostrará cómo utilizarla.
- Puede utilizar Saxenda® a cualquier hora del día, con o sin alimentos y bebidas.
- Utilice Saxenda® aproximadamente a la misma hora todos los días - elija la hora que más le convenga.

¿Dónde inyectarse?
Saxenda® se administra como una inyección bajo la piel (inyección subcutánea).
- Las mejores zonas para la administración son el abdomen, la parte frontal del muslo o la parte superior del brazo.
- Cambie el lugar donde se inyecta cada día para reducir el riesgo de desarrollar bultos en la piel.
- No se inyecte en una vena o músculo.

En la otra cara de este prospecto encontrará instrucciones detalladas sobre su uso.

Personas con diabetes
Informe a su médico si tiene diabetes. Su médico puede ajustar la dosis de su medicación para la diabetes para evitar un bajo nivel de azúcar en sangre.
- No confunda Saxenda® con otros medicamentos inyectables (por ejemplo, insulinas).
- No utilice Saxenda® en combinación con otros medicamentos que contengan agonistas del receptor de GLP-1 (como exenatida, lixisenatida).

Si usa más Saxenda® del que debería
Si usa más Saxenda® del que debería, hable con un médico o vaya inmediatamente a un hospital. Lleve con usted el envase del medicamento. Puede que necesite tratamiento médico. Podrían producirse los siguientes efectos:
- náuseas;
- vómitos;
- bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia). Por favor, consulte *"Efectos adversos frecuentes"* para ver los signos de advertencia de un descenso de azúcar en sangre.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con un centro de toxicología:
Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Si olvidó usar Saxenda®
- Si olvida una dosis y se acuerda de ello durante las 12 horas siguientes al horario en que generalmente se administra la dosis, adminístresela tan pronto como se acuerde.
- Sin embargo, si han pasado más de 12 horas desde que debería haber usado Saxenda®, saltee la dosis olvidada y adminístrese la siguiente dosis al día siguiente a la hora habitual.
- No se administre el doble de la dosis ni aumente la dosis del día siguiente para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con Saxenda®
No interrumpa el tratamiento con Saxenda® sin consultar a su médico.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los tengan.

Efectos adversos graves
Pocas veces se han notificado reacciones alérgicas graves (anafilaxia) en pacientes que utilizan Saxenda®. Acuda a su médico inmediatamente si tiene síntomas tales como problemas respiratorios, hinchazón de la cara y la garganta, y palpitaciones.

Con muy poca frecuencia se han notificado casos de inflamación del páncreas (pancreatitis) en pacientes que utilizan Saxenda®. La pancreatitis es una enfermedad grave y potencialmente mortal. Deje de usar Saxenda® y contacte a su médico inmediatamente si nota alguno de los siguientes efectos adversos graves:
- Dolor intenso y persistente en el abdomen (zona del estómago) que puede llegar hasta la espalda, así como náuseas y vómitos, ya que podría ser un signo de una inflamación del páncreas (pancreatitis).

Otros efectos adversos

Muy frecuentes: pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas
- Náuseas, vómitos, diarrea, constipación, dolor de cabeza - suelen desaparecer tras pocos días o semanas.

Frecuentes: pueden afectar a hasta 1 de cada 10 personas
- Problemas que afectan al estómago y a los intestinos, como indigestión (dispepsia), inflamación del revestimiento del estómago (gastritis), malestar estomacal, dolor en la parte superior del estómago, acidez, sensación de hinchazón, gases (flatulencia), eructos y boca seca.
- Sensación de debilidad o cansancio.
- Alteraciones en el sentido del gusto.
- Mareos.
- Dificultad para dormir (insomnio). Normalmente se produce durante los 3 primeros meses de tratamiento.
- Cálculos biliares.
- Erupción cutánea.
- Reacciones en el sitio de inyección (como hematomas, dolor, irritación, picazón y sarpullido).
- Nivel de azúcar en sangre bajo (hipoglucemia). Los signos de aviso de una disminución de azúcar en sangre pueden aparecer repentinamente e incluir: sudor frío, piel fría y pálida, dolor de cabeza, palpitaciones, náuseas, apetito excesivo, trastornos visuales, somnolencia, sensación de debilidad, nerviosismo, ansiedad, confusión, dificultad de concentración y temblores. Su médico le indicará cómo tratar el bajo nivel de azúcar en sangre y qué tiene que hacer en el caso de que observe estos signos de aviso.
- Aumento de enzimas pancreáticas, tales como lipasa y amilasa.

Poco frecuentes: pueden afectar a hasta 1 de cada 100 personas
- Pérdida de líquidos (deshidratación). Esto es más probable que ocurra al principio del tratamiento y puede ser debido a los vómitos, náuseas y diarrea.
- Retraso en el vaciado del estómago.
- Vesícula biliar inflamada.
- Reacciones alérgicas, incluyendo erupciones cutáneas.
- Sensación de malestar general.
- Pulso más rápido.

Raros: pueden afectar a hasta 1 de cada 1.000 personas
- Función renal disminuida.
- Falla renal aguda. Entre los síntomas se pueden incluir la disminución del volumen urinario, sabor metálico en la boca y facilidad para desarrollar hematomas (moretones).

Frecuencia no conocida: no puede estimarse a partir de los datos disponibles
- Obstrucción intestinal: una forma grave de constipación con síntomas adicionales como dolor de estómago, hinchazón, vómitos, etc.
- Pueden producirse bultos bajo la piel por la acumulación de una proteína denominada amiloide (amiloidosis cutánea; no se conoce la frecuencia con la que esto ocurre).

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. ¿Cómo conservar Saxenda®?

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
No utilice Saxenda® después de la fecha de vencimiento que aparece en la etiqueta de la lapicera y en el estuche después de "Vence". La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

Antes del primer uso
Conservar en heladera (entre 2°C y 8°C). No congelar.
Mantener alejado del congelador.

Una vez que comienza a utilizar la lapicera
Puede conservar la lapicera durante un mes si la mantiene por debajo de 30°C o en heladera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Mantener alejado del congelador.

Cuando no la esté usando, conserve la lapicera con el capuchón colocado para protegerla de la luz.

No utilice este medicamento si observa que la solución no es transparente e incolora o casi incolora.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura doméstica. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Saxenda®
- El principio activo es liraglutida. 1 ml de solución inyectable contiene 6 mg de liraglutida. Una lapicera prellenada contiene 18 mg de liraglutida.
- Los demás componentes son fosfato disódico dihidrato, propilenglicol, fenol, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio (para ajuste del pH) y agua para inyectables.

Aspecto de Saxenda® y contenido del envase
Saxenda® se suministra como una solución inyectable transparente, incolora o casi incolora en una lapicera prellenada. Cada lapicera contiene 3 ml de solución y puede administrar dosis de 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg y 3,0 mg.

Saxenda® está disponible en envases de 1, 3 ó 5 lapiceras. Es posible que no todas las presentaciones se encuentren comercializadas.

Las agujas no están incluidas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: http://www.anmat.gob.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 58.515
Disposición Nº 7903/25 (22-oct-2025)

Importado por:
Novo Nordisk Pharma Argentina S.A.
Domingo de Acassuso 3780/90, 1° Piso "A" (Noreste),
Olivos, Pcia. de Buenos Aires.
Director Técnico: Aldo A. Chiarelli – Farmacéutico.

Servicio de Atención al Cliente:
0800-345-NOVO (6686)
atencioncli@novonordisk.com

Elaborado por:
Novo Nordisk A/S
Novo Allé, 2880 Bagsvaerd, Dinamarca.

Acondicionado por:
Novo Nordisk A/S
Brennum Park, 3400 Hillerod, Dinamarca.

Saxenda® y NovoFine® son marcas registradas propiedad de Novo Nordisk A/S, Dinamarca.
© 2025
Novo Nordisk A/S

8-9556-55-020-4

Length: Max. 29 mm (100%)
Code: 100% Direction →
Code centered

Saxenda®
Liraglutida 6 mg/ml
Solución inyectable en lapicera prellenada


— 8 mm
— 1 mm

Instrucciones de uso de Saxenda® 6 mg/ml, solución inyectable en lapicera prellenada

Por favor lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su lapicera prellenada Saxenda®.
No utilice la lapicera sin haber recibido el entrenamiento adecuado de su médico o enfermero.
Comience comprobando la lapicera para **asegurarse de que contiene Saxenda® 6 mg/ml** y después observe las ilustraciones para familiarizarse con las distintas partes de su lapicera y aguja.
Si es ciego o tiene visión reducida y no puede leer el contador de dosis de la lapicera, no utilice esta lapicera sin ayuda. Busque la ayuda de una persona que vea bien y esté entrenada en el uso de la lapicera prellenada Saxenda®.
Su lapicera es una lapicera prellenada dosificadora. Contiene 18 mg de liraglutida y administra dosis de 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg y 3,0 mg. La lapicera prellenada está diseñada para ser utilizada con agujas descartables NovoFine® de hasta 8 mm de longitud y de un calibre tan delgado como 32G.
Las agujas no están incluidas en el envase.


⚠ Información importante
Preste especial atención a estas notas porque son importantes para el uso seguro de la lapicera.

Saxenda® lapicera prellenada y aguja (ejemplo)




1. Preparación de su lapicera con una aguja nueva


- **Compruebe el nombre y el color de la etiqueta** de su lapicera para asegurarse de que contiene Saxenda®. Esto es especialmente importante si utiliza más de un tipo de medicamento inyectable. El uso de un medicamento incorrecto puede ser perjudicial para su salud.
- **Retire el capuchón de la lapicera.**




- **Compruebe que la solución de su lapicera tiene un aspecto transparente** e incoloro. Mire a través de la ventana de la lapicera. Si la solución tiene un aspecto turbio, no utilice la lapicera.




- **Tome una aguja nueva** y retire la lengüeta de papel.




Asegúrese de colocar la aguja correctamente.
- **Coloque la aguja recta en la lapicera.**
- **Enróskuela hasta que quede apretada.**



La aguja está cubierta por dos tapas. Debe quitar ambas tapas. Si olvida quitar ambas tapas, **no** se inyectará ninguna solución.
- **Retire la tapa externa de la aguja y guárdela para más tarde.** La necesitará después de la inyección para retirar la aguja de la lapicera de forma segura.



- **Retire la tapa interna de la aguja y descártela.** Si intenta volver a colocarla, puede pincharse accidentalmente con la aguja.
Puede aparecer una gota de solución en la punta de la aguja. Esto es normal, pero a pesar de ello debe comprobar el flujo si utiliza una lapicera nueva por primera vez.



No coloque una aguja nueva en la lapicera hasta que esté listo para administrarse la inyección.

⚠ Utilice siempre una aguja nueva para cada inyección.
De esta forma puede evitar que las agujas se bloqueen, las contaminaciones, las infecciones y las dosificaciones inexactas.

⚠ Nunca utilice agujas dobladas o dañadas.


2. Comprobación del flujo con cada lapicera nueva

- Si su lapicera ya está en uso, vaya al paso 3. *Selección de su dosis.* Compruebe el flujo solamente antes de la **primera inyección con cada lapicera nueva.**
- Gire el selector de dosis **hasta el símbolo de comprobación de flujo (• • ▬)** justo después del 0. Asegúrese de que el símbolo de comprobación de flujo se alinee con el marcador de dosis.



- Sujete la lapicera con la aguja apuntando hacia arriba.

Presione y mantenga presionado el botón pulsador hasta que el contador de dosis vuelva a 0. El 0 debe quedar alineado con el marcador de dosis. Debe aparecer una gota de solución en la punta de la aguja.




Puede que una pequeña gota quede en la punta de la aguja, pero no se inyectará.
Si no aparece una gota, repita el paso 2. *Comprobación del flujo con cada lapicera nueva* hasta 6 veces. Si sigue sin aparecer una gota, cambie la aguja y repita el paso 2. *Comprobación del flujo con cada lapicera nueva*, una vez más.
Si, a pesar de todo, no aparece una gota, descarte la lapicera y utilice una nueva.

⚠ Asegúrese siempre de que aparezca una gota en la punta de la aguja antes de utilizar una lapicera nueva por primera vez. Así se asegura de que la solución fluye.
Si no aparece una gota, **no** se inyectará medicamento, aunque el contador de dosis se mueva. **Esto puede indicar que la aguja está bloqueada o dañada.**
Si no comprueba el flujo antes de la primera inyección con cada lapicera nueva, es posible que no se administre la dosis prescrita y que Saxenda® no produzca el efecto previsto.

3. Selección de su dosis

- **Gire el selector de dosis hasta que aparezca su dosis en el contador de dosis (0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg o 3,0 mg).**




Si ha seleccionado una dosis incorrecta, puede girar el selector de dosis hacia adelante o hacia atrás para seleccionar la dosis correcta. La lapicera puede seleccionar hasta un máximo de 3,0 mg.

El selector de dosis cambia la dosis. Solamente el contador de dosis y el marcador de dosis muestran cuántos mg ha seleccionado en cada administración.
Puede seleccionar hasta 3,0 mg por dosis. Cuando la lapicera contiene menos de 3,0 mg, el contador de dosis se detiene antes de que aparezca 3.0.
El selector de dosis hace clic de forma diferente cuando se gira hacia adelante, hacia atrás o se pasa del número de mg que quedan. No cuente los clics de la lapicera.

⚠ Antes de administrarse el medicamento, utilice siempre el contador de dosis y el marcador de dosis para ver cuántos mg ha seleccionado.
No cuente los clics de la lapicera.
No utilice la escala de la lapicera, ya que solo muestra la cantidad aproximada de solución que queda en esta.
Con el selector de dosis sólo deben seleccionarse dosis de 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg o 3,0 mg.
La dosis seleccionada tiene que estar alineada de manera exacta con el indicador de dosis para asegurar que la dosis inyectada sea la correcta.


¿Cuánta solución queda?

- La **escala de la lapicera** muestra la cantidad **aproximada** de solución que queda en la lapicera.



- **Para saber cuánta solución queda exactamente,** utilice el contador de dosis:

Gire el selector de dosis hasta que el **contador de dosis se detenga.**
Si muestra 3.0, significa que quedan **al menos 3,0 mg** en la lapicera. Si el **contador de dosis se detiene antes de 3,0 mg**, significa que no queda suficiente solución para una dosis completa de 3,0 mg.




Si necesita más medicamento del que queda en su lapicera
Solo si su médico o enfermero lo aconsejan y le han enseñado a hacerlo, puede dividir la dosis entre la lapicera en uso y una nueva lapicera. Utilice una calculadora para planificar las dosis según le haya indicado su médico o enfermero.


⚠ Tenga mucho cuidado de hacer el cálculo correctamente.
Si no está seguro de cómo dividir la dosis utilizando dos lapiceras, seleccione e inyéctese la dosis que necesita con una lapicera nueva.

4. Inyección de la dosis


- **Inserte la aguja bajo su piel** tal como le ha enseñado su médico o enfermero.
- **Compruebe que puede ver el contador de dosis.** No lo tape con los dedos. Esto podría interrumpir la inyección.




- **Presione y mantenga presionado el botón pulsador. Observe cómo el contador de dosis vuelve a 0.** El 0 debe quedar alineado con el marcador de dosis. En ese momento puede que oiga o sienta un clic.
- **Continue presionando el botón pulsador mientras mantiene la aguja en su piel.**



- **Cuente lentamente hasta 6 mientras mantiene presionado el botón pulsador.**
- Si retira antes la aguja, puede que vea salir solución de la punta de la aguja. Esto significa que no se ha administrado la dosis completa.



- **Retire la aguja de su piel. Luego puede soltar el botón pulsador.**
Si aparece sangre en el sitio de inyección, presione ligeramente.



Puede aparecer una gota de solución en la punta de la aguja después de la inyección. Esto es normal y no afecta a la dosis.

⚠ Observe siempre el contador de dosis para saber cuántos mg inyecta. Presione y mantenga presionado el botón pulsador hasta que el contador de dosis indique 0.


¿Cómo detectar si la aguja está bloqueada o dañada?
- Si no aparece el 0 en el contador de dosis después de presionar continuamente el botón pulsador, puede que haya usado una aguja bloqueada o dañada.
- En este caso, **no** habrá recibido **nada** de medicamento, incluso aunque el contador de dosis se haya movido de la dosis original que seleccionó.

¿Qué hacer si la aguja está bloqueada?
Cambie la aguja tal como se describe en el paso 5. *"Después de la inyección"*, y repita todos los pasos desde el paso 1. *"Preparación de su lapicera con una aguja nueva"*. Asegúrese de seleccionar la dosis completa que necesita.


No toque nunca el contador de dosis mientras se está inyectando. Esto puede interrumpir la inyección.

5. Después de la inyección


- **Descarte siempre la aguja después de cada inyección para asegurar que las inyecciones se administren correctamente** y prevenir el bloqueo de agujas. Si la aguja está bloqueada, **no** se inyectará nada de medicamento.
- **Introduzca la punta de la aguja en su tapa externa,** colocada sobre una superficie plana, sin tocar la aguja ni la tapa externa de la aguja.



- Cuando la aguja esté cubierta, **presione completamente y con cuidado la tapa externa.**
- **Desenrosque la aguja** y descártela con cuidado, siguiendo las instrucciones de su médico, enfermero, farmacéutico o de las autoridades locales.



- **Coloque el capuchón** en la lapicera después de cada uso para proteger la solución de la luz.



Cuando la lapicera está vacía, deséchela **sin** una aguja colocada, siguiendo las instrucciones de su médico, enfermero, farmacéutico o de las autoridades locales.

⚠ Nunca intente volver a colocar la tapa interna de la aguja. Podría pincharse con la aguja.

⚠ Retire siempre la aguja de la lapicera después de cada inyección. De esta forma puede prevenir que las agujas se bloqueen, las contaminaciones, las infecciones, las pérdidas de solución y las dosificaciones inexactas.

⚠ Información importante adicional

- Mantenga siempre la lapicera y las agujas **fuera de la vista y del alcance de otras personas**, especialmente de los niños.
- **Nunca comparta** la lapicera o las agujas con otras personas.
- Las personas que atienden a los pacientes deben **tener mucho cuidado cuando manejen agujas usadas** para evitar pinchazos accidentales e infecciones.
- Cambie el lugar donde se inyecta cada día para reducir el riesgo de desarrollar bultos bajo la piel.

Cuidados de su lapicera

- **No deje la lapicera en el auto** ni en otro lugar donde pueda calentarse o enfriarse en exceso.
- **No se inyecte Saxenda® si se ha congelado.** Si lo hace, puede que no alcance el efecto previsto de este medicamento.
- **No exponga la lapicera al polvo, la suciedad o líquidos.**
- **No lave, ponga en remojo ni lubrique la lapicera.** Puede limpiarse con un paño humedecido con un detergente suave.
- **Procure que la lapicera no se caiga** ni golpee contra superficies duras. Si se le cae la lapicera o sospecha que puede tener un problema, coloque una aguja nueva y compruebe el flujo antes de inyectarse.
- **No intente rellenar la lapicera.** Una vez vacía, se debe descartar.
- **No intente reparar la lapicera** ni desarmarla.