Regulatory Operations

Insert: 2010-508x462-014b
LIFT - Current 5

SemaObesity
PATIENT

Colour:
PMS 280C +
Black

Wegovy®
Semaglutida

0,25 mg/dosis, 0,5 mg/dosis, 1 mg/dosis, 1,7 mg/dosis y 2,4 mg/dosis

Solución inyectable en lapicera prellenada FlexTouch®

VENTA BAJO RECETA **INDUSTRIA DANESA**

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a utilizar este medicamento, ya que contiene información importante para usted.
- Conserve este prospecto. Es posible que deba volver a leerlo.
- Si tiene más preguntas, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted. No se lo dé a otras personas. Puede hacerles daño, aunque tengan los mismos síntomas que usted.
- Si tiene algún efecto adverso, hable con su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto adverso que no esté incluido en este prospecto. Vea la sección 4 *"Posibles efectos adversos"*.

Contenido del prospecto
1. ¿Qué es Wegovy® y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de usar Wegovy®?
3. ¿Cómo usar Wegovy®?
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Wegovy®
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿Qué es Wegovy® y para qué se utiliza?

¿Qué es Wegovy®?
Wegovy® es un medicamento para la pérdida de peso y el mantenimiento del peso que contiene el principio activo semaglutida. Es similar a una hormona natural llamada péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) que se libera desde el intestino después de comer. Actúa sobre receptores del cerebro que controlan el apetito, haciendo que se sienta más lleno y con menos hambre y que sienta menor ansiedad por comer. Esto le ayudará a comer menos y a reducir su peso corporal. Wegovy® puede ayudar también a prevenir una enfermedad cardíaca.

Para qué se utiliza Wegovy®
Wegovy® se utiliza en combinación con dieta y actividad física para la pérdida de peso y para ayudar a mantener el peso bajo control. Se utiliza en adultos que tienen
- un IMC de 30 kg/m² o superior (obesidad); o
- un IMC de al menos 27 kg/m² pero menos de 30 kg/m² (sobrepeso) que presentan problemas de salud relacionados con el peso (como diabetes, hipertensión arterial, niveles anormales de grasas en sangre, problemas respiratorios durante el sueño denominados "apnea obstructiva del sueño", o antecedentes de infarto, accidente cerebrovascular o problemas vasculares).

El IMC (índice de masa corporal) es una medida de su peso en relación con su altura.

Wegovy® se utiliza en combinación con dieta y actividad física para el control del peso en adolescentes de 12 años de edad en adelante con
- obesidad y
- peso corporal mayor a 60 kg.

Como paciente adolescente, solo debe seguir utilizando Wegovy® si ha perdido al menos el 5% de su IMC después de 12 semanas en tratamiento con la dosis de 2,4 mg o la dosis máxima tolerada (ver sección 3 *¿Cómo usar Wegovy®?*). Consulte a su médico antes de continuar.

2. ¿Qué necesita saber antes de usar Wegovy®?

No utilice Wegovy®
- si es alérgico a semaglutida o a alguno de los otros componentes de este medicamento (listados en la sección 6 *"Contenido del envase e información adicional"*).

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Wegovy®.

No se recomienda el uso de Wegovy® si:
- utiliza otros productos para perder peso;
- tiene diabetes tipo 1;
- tiene la función renal gravemente reducida;
- tiene la función hepática gravemente reducida;
- tiene insuficiencia cardíaca grave;
- tiene enfermedad ocular diabética (retinopatía).

Hay poca experiencia con Wegovy® en pacientes:
- de 85 años o más;
- con problemas hepáticos;

Consulte a su médico si se encuentra en alguno de los casos anteriores.

Si sabe que le realizarán una intervención quirúrgica en la que se someterá a anestesia, informe a su médico que está utilizando Wegovy®.

- Deshidratación

Durante el tratamiento con Wegovy®, podría tener náuseas, vómitos o diarrea. Estos efectos adversos pueden provocar deshidratación (pérdida de líquidos). Es importante beber suficiente líquido para prevenir la deshidratación. Esto es especialmente importante si tiene problemas renales. Si tiene alguna duda o pregunta, hable con su médico.

- Inflamación del páncreas

Si tiene dolor intenso y persistente en el área del estómago (vea la sección 4 *"Posibles efectos adversos"*), consulte a un médico de inmediato, ya que esto podría ser un signo de inflamación del páncreas (pancreatitis aguda).

- Personas con diabetes tipo 2

Wegovy® no puede utilizarse como sustituto de la insulina. No utilice Wegovy® en combinación con otros medicamentos que contengan agonistas del receptor de GLP-1 (como liraglutida, dulaglutida, exenatida o lixisenatida).

- Nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia)

Utilizar una sulfonilurea o una insulina con Wegovy® puede aumentar el riesgo de tener niveles bajos de azúcar en sangre (hipoglucemia). Consulte la sección 4 *"Posibles efectos adversos"* para conocer los signos de advertencia de niveles bajos de azúcar en sangre.
Es posible que su médico le solicite que controle sus niveles de azúcar en sangre. Esto ayudará a su médico a decidir si es necesario cambiar la dosis de sulfonilurea o insulina para reducir el riesgo de niveles bajos de azúcar en sangre.

- Enfermedad ocular diabética (retinopatía)

Si tiene enfermedad ocular diabética y está utilizando insulina, este medicamento puede conducir a un empeoramiento de su visión, y esto puede requerir tratamiento. Las mejorías rápidas en el control del azúcar en sangre pueden provocar un empeoramiento temporal de la enfermedad ocular diabética. Si tiene enfermedad ocular diabética y presenta problemas oculares mientras utiliza este medicamento, hable con su médico.

- Cambios repentinos en la visión

Si nota una pérdida repentina o un empeoramiento rápido de la visión durante el tratamiento con este medicamento, consulte inmediatamente a su médico para recibir asesoramiento. Esto podría deberse a un efecto adverso muy raro llamado neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION, por sus siglas en inglés) (ver en la sección 4 *"Efectos adversos graves"*). Su médico puede derivarlo para que se realice un examen oftalmológico y puede que tenga que interrumpir el tratamiento con este medicamento.

- Pacientes con retraso en el vaciamiento gástrico (gastroparesia)

Si su vaciamiento gástrico es lento (demorado), llamado gastroparesia, el uso de Wegovy® puede causar eventos adversos gastrointestinales serios o graves. Hable con su médico antes de utilizar Wegovy®.

Niños y adolescentes
No se ha estudiado la seguridad y la eficacia de Wegovy® en niños menores de 12 años de edad y no se recomienda su uso en esta población.

Otros medicamentos y Wegovy®
Informe a su médico, farmacéutico o enfermero si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría utilizar algún otro medicamento.

En particular, informe a su médico, farmacéutico o enfermero si está utilizando medicamentos que contengan lo siguiente:
- Warfarina u otros medicamentos similares tomados por vía oral para reducir la coagulación de la sangre (anticoagulantes orales). Cuando inicie el tratamiento con, por ejemplo, warfarina o con medicamentos similares, puede ser necesario realizar análisis de sangre frecuentes para determinar la capacidad de coagulación de su sangre.

Embarazo y lactancia
Este medicamento no debe usarse durante el embarazo, ya que se desconoce si puede afectar a su bebé en gestación. Por lo tanto, se recomienda usar métodos anticonceptivos mientras utiliza este medicamento. Si quiere quedar embarazada, debe dejar de utilizar este medicamento con al menos dos meses de antelación. Si queda embarazada o está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de tener un bebé mientras está usando este medicamento, hable con su médico de inmediato, ya que deberá interrumpir su tratamiento.

No utilice este medicamento si se encuentra en período de lactancia, ya que se desconoce si pasa a la leche materna.

Conducción y uso de máquinas
Es improbable que Wegovy® afecte su capacidad para conducir y utilizar máquinas. Algunos pacientes pueden sentir mareos cuando utilizan Wegovy® principalmente durante los primeros cuatro meses de tratamiento (vea la sección 4 *"Posibles efectos adversos"*). Si se siente mareado, tenga mucho cuidado cuando conduzca o utilice máquinas. Si necesita más información, hable con su médico, farmacéutico, o enfermero.

Personas con diabetes tipo 2
Si usa este medicamento en combinación con una sulfonilurea o insulina, podría experimentar un nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia) que puede reducir su capacidad para concentrarse. Evite conducir o usar máquinas si presenta síntomas de bajo nivel de azúcar en sangre. Consulte la sección 2 *"Advertencias y precauciones"*, para obtener información sobre el riesgo aumentado de bajo nivel de azúcar en sangre y la sección 4 *"Posibles efectos adversos"* para conocer los signos de advertencia del bajo nivel de azúcar en sangre. Hable con su médico para más información.

Contenido de sodio de Wegovy®
Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis; es decir, el medicamento es esencialmente "libre de sodio".

3. ¿Cómo usar Wegovy®?

Use siempre este medicamento exactamente como su médico le ha indicado. Si no está seguro, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.

Cuánto usar
Adultos

Su tratamiento se iniciará con una dosis baja que se aumentará gradualmente durante 16 semanas de tratamiento.
- Cuando empieza a usar Wegovy®, la dosis inicial es de 0,25 mg una vez a la semana.
- El médico le indicará que aumente la dosis gradualmente cada 4 semanas hasta alcanzar la dosis de 2,4 mg una vez a la semana.
- Si es necesario, después de un mínimo de 4 semanas con la dosis de 2,4 mg, pueden aumentarle la dosis a la siguiente dosis de mantenimiento de 7,2 mg una vez a la semana (3 inyecciones de 2,4 mg).
- La dosis máxima es de 7,2 mg una vez a la semana.
- En caso de que se sienta muy molesto por las náuseas o vómitos, hable con su médico sobre la posibilidad de retrasar el aumento de la dosis o de bajar a la dosis anterior hasta que los síntomas hayan mejorado.

En general, se le indicará que siga la siguiente tabla.

Aumento escalonado de la dosis	Dosis semanal
Semana 1-4	0,25 mg
Semana 5-8	0,5 mg
Semana 9-12	1 mg
Semana 13-16	1,7 mg
A partir de la semana 17	2,4 mg
A partir de la semana 21	2,4 mg o 7,2 mg

El médico evaluará su tratamiento de forma periódica.

Adolescentes (mayores de 12 años)
Para adolescentes, se debe aplicar el mismo esquema de aumento escalonado de la dosis de los adultos (ver arriba). La dosis se debe incrementar hasta 2,4 mg (dosis de mantenimiento) o hasta que se alcance la máxima dosis tolerada. No se recomiendan dosis semanales superiores a 2,4 mg.

Cómo se administra Wegovy®
Wegovy® se administra por inyección bajo la piel (inyección subcutánea). No lo inyecte en una vena ni en un músculo.
- Los mejores lugares para administrar la inyección son el frente de la parte superior del brazo, del muslo o el abdomen.
- Antes de usar la lapicera por primera vez, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero cómo usarla.

Para la dosis de 7,2 mg, inyecte tres dosis de 2,4 mg una después de la otra. Las inyecciones pueden administrarse en la misma zona del cuerpo, pero con una separación de al menos 5 cm.

Las instrucciones de uso detalladas sobre cómo utilizar la lapicera se encuentran en el dorso de este prospecto.

Personas con diabetes tipo 2
Informe a su médico si tiene diabetes tipo 2. Su médico podría ajustar la dosis de sus medicamentos para la diabetes para prevenir un bajo nivel de azúcar en sangre.

Cuándo utilizar Wegovy®
- Debe utilizar este medicamento una vez a la semana y, si es posible, el mismo día cada semana.
- Puede administrarse usted mismo la inyección en cualquier momento del día, independientemente de las comidas.

Si es necesario, puede cambiar el día de la inyección semanal de este medicamento siempre y cuando hayan transcurrido al menos 3 días desde la última inyección. Después de seleccionar un nuevo día de administración, continúe con la administración una vez por semana.

Si usa más Wegovy® del que debería
Hable con su médico de inmediato. Es posible que presente efectos adversos, como náuseas, vómitos o diarrea, que pueden causar deshidratación (pérdida de líquidos).

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con un centro de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Si se olvida de usar Wegovy®
Si olvidó inyectarse una dosis y:
- pasaron 5 días o menos desde que debería haber usado Wegovy®, adminístreselo en cuanto lo recuerde. Luego, inyecte la siguiente dosis como de costumbre el día programado.
- pasaron más de 5 días desde que debería haber usado Wegovy®, saltee la dosis olvidada. Luego, inyecte la siguiente dosis como de costumbre el próximo día programado.

No se administre una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si deja de usar Wegovy®
No interrumpa el tratamiento con este medicamento sin consultar a su médico.

Si tiene alguna otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos adversos, aunque no todas las personas los tengan.

Efectos adversos graves

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)
- Complicaciones de la enfermedad ocular diabética (retinopatía diabética). Si tiene diabetes, debe informar a su médico si presenta problemas oculares, como cambios en la visión, durante el tratamiento con este medicamento.

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)
- Inflamación del páncreas (pancreatitis aguda). Los signos de inflamación del páncreas pueden incluir dolor intenso y persistente en el estómago; el dolor puede trasladarse a la espalda. Debe consultar al médico de inmediato si experimenta dichos síntomas.

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)
- Reacciones alérgicas graves (reacciones anafilácticas, angioedema). Debe buscar ayuda médica de inmediato e informar a su médico inmediatamente si tiene síntomas tales como dificultad para respirar, hinchazón, sensación de mareo o aturdimiento, latidos cardíacos acelerados, transpiración y pérdida del conocimiento o rápida hinchazón bajo la piel en áreas como la cara, la garganta, brazos y piernas, que puede poner en peligro su vida si la hinchazón de la garganta bloquea el paso del aire.

Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas)
- Una enfermedad ocular llamada neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION, por sus siglas en inglés), que puede causar pérdida de visión sin dolor en uno de los ojos. Debe contactar inmediatamente a su médico si nota una pérdida repentina o un empeoramiento progresivo de la visión (ver en la sección 2 *"Cambios repentinos en la visión"*).

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)
- Obstrucción intestinal. Una forma grave de estreñimiento con otros síntomas como dolor de estómago, hinchazón abdominal, vómitos, etc.

Otros efectos adversos
Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)
- Dolor de cabeza
- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Estreñimiento
- Dolor de estómago
- Sensación de debilidad o cansancio

Estos efectos adversos se observan principalmente durante el aumento escalonado de la dosis y normalmente desaparecen con el tiempo.

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)
- Sentirse mareado
- Malestar estomacal o indigestión
- Eructos
- Gases (flatulencias)
- Hinchazón del estómago
- Estómago inflamado ("gastritis") – los signos incluyen dolor de estómago, náuseas o vómitos
- Reflujo o acidez estomacal – también llamado "enfermedad por reflujo gastroesofágico"
- Cálculos biliares
- Caída del cabello – puede ocurrir más frecuentemente con semaglutida 7,2 mg
- Reacciones en el sitio de inyección
- Cambio en el sabor de la comida o la bebida
- Cambio en la sensación de la piel – normalmente esto desaparece con el tiempo, y puede ocurrir más frecuentemente con semaglutida 7,2 mg
- Nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia) en pacientes con diabetes tipo 2.

Los signos de advertencia de bajo nivel de azúcar en sangre pueden presentarse de forma repentina. Estos pueden incluir: sudoración fría, piel pálida y fría, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados, náuseas o sentirse hambriento, cambios en la visión, sensación de somnolencia o debilidad, sensación de nerviosismo, ansiedad o confusión, dificultad para concentrarse o temblores.

Su médico le indicará cómo tratar el nivel bajo de azúcar en sangre y qué tiene que hacer en el caso de que note estos signos de advertencia.

Es más probable que se produzca un bajo nivel de azúcar en sangre si también utiliza una sulfonilurea o insulina. Su médico puede reducir su dosis de esos medicamentos antes de que comience a usar este medicamento.

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)
- Baja presión arterial
- Sensación de mareo o aturdimiento al ponerse de pie o sentarse debido a un descenso de la presión arterial
- Latidos cardíacos acelerados
- Aumento de las enzimas pancreáticas (como lipasa y amilasa) en los análisis de sangre
- Un retraso en el vaciamiento del estómago.

Notificación de efectos adversos
Si tiene algún efecto adverso, hable con su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto adverso que no esté listado en este prospecto.

5. Conservación de Wegovy®

Mantenga este medicamento fuera del alcance y la vista de los niños.

No use este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en la etiqueta y en el estuche de la lapicera después de "Vence". La fecha de vencimiento se refiere al último día de ese mes.

Antes del uso:
Conservar en heladera (entre 2°C y 8°C). No congelar.
Mantener alejado del elemento refrigerante.

Durante el uso:
Puede conservar la lapicera por hasta 6 semanas a una temperatura inferior a 30°C o en heladera (entre 2°C y 8°C), lejos del elemento refrigerante. No congelar ni utilizar Wegovy® si se ha congelado.

Cuando no esté utilizando la lapicera, mantenga el capuchón colocado para protegerla de la luz.

No utilice este medicamento si nota que la solución no es transparente e incolora.

No descarte ningún medicamento por los desagües o a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo descartar los medicamentos que ya no utiliza. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Wegovy®
- El principio activo es semaglutida.
- Los demás componentes son fosfato disódico dihidrato, propilenglicol, fenol, hidróxido de sodio/ácido clorhídrico (para ajuste del pH), agua para inyectables. Vea también la sección 2 *"Contenido de sodio de Wegovy®"*, para más información sobre el sodio.

Wegovy® 0,25 mg/dosis, solución inyectable:
Una lapicera prellenada contiene 1 mg de semaglutida en 1,5 ml de solución (0,68 mg/ml).

Wegovy® 0,5 mg/dosis, solución inyectable:
1,5 ml: Una lapicera prellenada contiene 2 mg de semaglutida en 1,5 ml de solución (1,34 mg/ml).
3 ml: Una lapicera prellenada contiene 2 mg de semaglutida en 3 ml de solución (0,68 mg/ml).

Wegovy® 1 mg/dosis, solución inyectable:
Una lapicera prellenada contiene 4 mg de semaglutida en 3 ml de solución (1,34 mg/ml).

Wegovy® 1,7 mg/dosis, solución inyectable:
Una lapicera prellenada contiene 6,8 mg de semaglutida en 3 ml de solución (2,27 mg/ml).

Wegovy® 2,4 mg/dosis, solución inyectable:
Una lapicera prellenada contiene 9,6 mg de semaglutida en 3 ml de solución (3,2 mg/ml).

Aspecto de Wegovy® y contenido del envase
Wegovy® es una solución inyectable transparente e incolora en una lapicera prellenada.
Cada lapicera contiene cuatro dosis. Después de haber inyectado las 4 dosis, podría quedar solución remanente en la lapicera, por más que las dosis se hayan administrado correctamente. Cualquier solución remanente es insuficiente para una dosis y la lapicera debe descartarse.

Envases conteniendo 1 lapicera prellenada FlexTouch® y 4 agujas descartables NovoFine® Plus (PM-739-19).

Puede que no todas las presentaciones se encuentren comercializadas.

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de ANMAT: http://www.anmat.gob.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde al 0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 59.900
Disposición N° 5282/26 (19-ago-2026)

Importado por:
Novo Nordisk Pharma Argentina S.A.
Domingo de Acassuso 3780/90, 1° Piso "A" (Noreste),
Olivos, Pcia. de Buenos Aires.
Director Técnico: Aldo A. Chiarelli – Farmacéutico.

Servicio de Atención al Cliente:
0800-345-NOVO (6686)
atencioncli@novonordisk.com

Elaborado por:
Novo Nordisk A/S
Novo Allé, 2880 Bagsvaerd / Brennum Park, 3400 Hillerod
Dinamarca

Acondicionado por:
Novo Nordisk A/S
Brennum Park, 3400 Hillerod,
Dinamarca

Wegovy®, FlexTouch® y NovoFine® son marcas registradas propiedad de Novo Nordisk A/S, Dinamarca.

© 2026
Novo Nordisk A/S

8-9518-55-001-4

wegovy®

Semaglutida
0,25 mg/dosis, 0,5 mg/dosis, 1 mg/dosis, 1,7 mg/dosis y 2,4 mg/dosis
Solución inyectable en lapicera prellenada FlexTouch®

NOTE:
QR code and above Text Box can be repositioned based on the text layout.

And this can be deleted if not in use.

8-9518-55-001-4.indd 1

Length: Max. 29 mm (100%)
Code: 100% Direction →
Code centered

1/10/2026 12:50:03

8 mm
1 mm

Instrucciones de uso de Wegovy®

Antes de empezar a utilizar su lapicera de Wegovy® de uso una vez por semana, **siempre lea atentamente estas instrucciones** y hable con su médico, enfermero o farmacéutico acerca de cómo inyectarse Wegovy® correctamente.

La lapicera de Wegovy® es una lapicera prellenada dosificadora que **contiene cuatro de sus dosis de Wegovy®.**

Por favor, utilice la tabla que se encuentra impresa en el interior del envase para llevar registro de cuántas inyecciones se ha administrado y cuántas dosis quedan en su lapicera.

Wegovy® se presenta en cinco variantes de lapicera, cada una conteniendo una de las siguientes dosis de semaglutida:

0,25 mg | 0,5 mg | 1 mg | 1,7 mg | 2,4 mg

Siempre empiece por verificar la etiqueta de su lapicera para asegurarse de que contiene su dosis prescrita de Wegovy®.

Su lapicera está diseñada para ser usada con agujas descartables de calibre 30G, 31G o 32G y de una longitud de hasta 8 mm.

El envase contiene:
- Una lapicera de Wegovy®
- 4 agujas NovoFine® Plus
- Prospecto

Lapicera Wegovy® FlexTouch® (ejemplo)

Atención: el tamaño y la etiqueta de su lapicera pueden ser diferentes de lo mostrado en las imágenes. Estas instrucciones corresponden a todas las lapiceras de Wegovy®.



Aguja NovoFine® Plus (ejemplo)




1 Prepare su lapicera con una aguja nueva

Verifique el nombre y la dosis de su lapicera para asegurarse de que contiene su dosis prescrita de Wegovy®.

Retire el capuchón de la lapicera.


(Ver figura A)



Verifique que la solución en su lapicera sea transparente e incolora. Mire a través de la ventana de la lapicera.

Si Wegovy® se ve turbio o con color, no utilice la lapicera.

(Ver figura B)




Siempre utilice una aguja nueva para cada inyección.

Tome una aguja cuando esté listo para administrarse la inyección. Revise la lengüeta de papel y la tapa externa de la aguja para detectar daños que pudieran afectar la esterilidad. Si observa algún daño, utilice una aguja nueva.


Retire la lengüeta de papel.

(Ver figura C)



Empuje la aguja recta en la lapicera. Gírela hasta que esté ajustada.

(Ver figura D)




La aguja está cubierta por dos tapas. Debe retirar ambas tapas. Si olvida retirar ambas tapas, no se inyectará Wegovy®.

Retire la tapa externa de la aguja y guárdela para más tarde. La necesitará para retirar la aguja de la lapicera de manera segura luego de la inyección.

Retire la tapa interna de la aguja y descártela. Puede que aparezca una gota de Wegovy® en la punta de la aguja. De todas formas, debe verificar el flujo de Wegovy® si utiliza una nueva lapicera por primera vez. Vea **"Verifique el flujo con cada nueva lapicera".**

Nunca utilice una aguja doblada o dañada. Para más información sobre la manipulación de agujas, vea **"Acerca de sus agujas"** debajo de estas instrucciones.

(Ver figura E)




Verifique el flujo con cada nueva lapicera

Si su lapicera de Wegovy® ya está en uso, vea **"2 Seleccione su dosis".**

Solamente verifique el flujo de Wegovy® antes de su **primera inyección con cada nueva lapicera**.

Gire el selector de dosis hasta que vea el símbolo de comprobación de flujo (••▬).

(Ver figura F)



Asegúrese de que el símbolo de comprobación de flujo se encuentre alineado con el indicador de dosis.

(Ver figura G)



Verifique el flujo
Sostenga la lapicera con la aguja apuntando hacia arriba.

Presione y mantenga presionado el botón pulsador hasta que el contador de dosis vuelva a **·0·**. El **·0·** debe quedar alineado con el indicador de dosis.

Debería aparecer una gota de Wegovy® en la punta de la lapicera. Esta gota indica que su lapicera está lista para ser usada.

Si no aparece una gota, verifique el flujo nuevamente. **Esto solo debe hacerse dos veces.**

Si aún no aparece una gota, **cambie la aguja y verifique el flujo una vez más.**

No utilice la lapicera si sigue sin aparecer una gota de Wegovy®.

(Ver figura H)



2 Seleccione su dosis

Gire el selector de dosis hasta que el **contador de dosis se detenga** y **muestre su dosis prescrita**.

(Ver figura I)



La línea punteada (¦) en el contador de dosis lo guiará hasta su dosis.

El selector de dosis suena diferente cuando se gira hacia adelante, hacia atrás o pasada su dosis. Escuchará un "clic" cada vez que gira el selector de dosis. No seleccione la dosis contando la cantidad de clics que escucha.

(Ver figura J)



Cuando su dosis prescrita se encuentre alineada con el indicador de dosis, usted ha seleccionado la dosis. En esta imagen se muestra la dosis de 0,25 mg como ejemplo.

Si el contador de dosis se detiene antes de haber alcanzado su dosis prescrita, vea la sección **"¿Tiene suficiente Wegovy®?"** debajo de estas instrucciones.


(Ver figura K)



Elija su sitio de inyección

Elija la parte superior de los brazos, los muslos o el abdomen (mantenga una distancia de 5 cm del ombligo).

Puede administrarse la inyección en la misma zona del cuerpo, pero asegúrese de que no sea el mismo punto que la vez anterior.




3 Inyecte su dosis

Inserte la aguja en su piel.

Asegúrese de poder ver el contador de dosis. No lo cubra con sus dedos. Esto podría interrumpir la inyección.

(Ver figura L)



Presione y mantenga presionado el botón pulsador hasta que el contador de dosis muestre ·0·.

(Ver figura M)

Continúe presionando el botón pulsador con la aguja en su piel y cuente lentamente hasta 6. El **·0·** debe alinearse con el indicador de dosis. Puede escuchar o sentir un clic cuando el contador de dosis vuelva a **·0·**.

(Ver figura N)




Retire la aguja de su piel. Si la aguja se retira antes de tiempo, puede salir solución de Wegovy® de la punta de la aguja y no se administrará la dosis completa.

Si aparece sangre en el sitio de inyección, presione levemente la zona para detener el sangrado.

Puede que vea una gota de Wegovy® en la punta de la aguja después de la inyección. Esto es normal y no afecta su dosis.

(Ver figura O)




4 Después de la inyección

Introduzca la punta de la aguja en la tapa externa de la aguja apoyada sobre una superficie plana, sin tocar la aguja ni la tapa externa**.**

Una vez que la aguja esté cubierta, empuje cuidadosamente la tapa externa de la aguja para colocarla completamente.

(Ver figura P)




Desenrosque la aguja y descártela cuidadosamente según lo indicado por su médico, enfermero, farmacéutico o las autoridades locales**.**

Nunca intente volver a colocarle la tapa interna a la aguja. Puede pincharse con la aguja.


Siempre descarte la aguja inmediatamente después de cada inyección para prevenir el bloqueo de agujas, contaminación, infección y dosificación inexacta. **Nunca guarde su lapicera con una aguja colocada.**

(Ver figura Q)



Coloque el capuchón en su lapicera después de cada uso para proteger a Wegovy® de la luz.

(Ver figura R)



Cuando la lapicera esté vacía, descártela sin una aguja colocada según lo indicado por su médico, enfermero, farmacéutico o las autoridades locales.

El capuchón de la lapicera y el estuche vacío pueden descartarse en los residuos domiciliarios.

Acerca de sus agujas

Cómo identificar una aguja bloqueada o dañada
- Si no aparece el **·0·** en el contador de dosis después de haber presionado continuamente el botón pulsador, es posible que haya utilizado una aguja bloqueada o dañada.
- En este caso, usted **no** recibió nada de Wegovy®, incluso si el contador de dosis se movió de la dosis originalmente seleccionada.

Cómo manejar una aguja bloqueada
- Cambie la aguja según lo indicado en **"1 Prepare su lapicera con una aguja nueva"** y luego vea **"2 Seleccione su dosis"**.

Cuidados de su lapicera

Trate a su lapicera con cuidado. La manipulación brusca o el mal uso pueden causar una dosificación inexacta. Si esto ocurre, es posible que no obtenga el efecto previsto de Wegovy®.
- Vea el otro lado de este prospecto para leer las condiciones de conservación de su lapicera.
- **No se administre Wegovy® que haya estado expuesto a la luz solar directa**.
- **No congele Wegovy® y nunca se administre Wegovy® que se haya congelado.** Descarte la lapicera.
- **No deje caer su lapicera** ni la golpee contra superficies duras.
- **No intente rellenar su lapicera.** Una vez vacía, debe descartarla.
- **No trate de reparar su lapicera** o desarmarla.
- **No exponga su lapicera al polvo, tierra o líquidos.**
- **No lave, sumerja ni lubrique su lapicera.** Si es necesario, límpiela con un detergente suave con un trapo humedecido.

¿Tiene suficiente Wegovy®?

Si el contador de dosis se detiene antes de haber alcanzado su dosis prescrita, no queda suficiente Wegovy® para una dosis completa. Descarte la lapicera y utilice una nueva.



⚠ Información importante

- **Solo utilice Wegovy® una vez por semana como se le ha prescrito.** Si no utiliza Wegovy® como le han prescrito, es posible que no obtenga el efecto previsto de este medicamento.
- Si utiliza más de un tipo de medicamento inyectable, es muy **importante que verifique el nombre y la dosis** en la etiqueta de su lapicera **antes del uso**.
- **No utilice esta lapicera sin ayuda si tiene problemas de visión y no puede seguir estas instrucciones.** Obtenga ayuda de una persona con buena visión que esté entrenada para usar la lapicera de Wegovy®.
- Siempre mantenga la lapicera y las agujas **fuera de la vista y el alcance de otras personas, especialmente de los niños.**
- **Nunca comparta** su lapicera o sus agujas con otras personas.
- **Las agujas son para un solo uso únicamente. Nunca reutilice sus agujas** ya que esto puede conducir a agujas bloqueadas, contaminación, infección y dosificación inexacta.
- Los cuidadores deben **manipular las agujas usadas con mucha precaución** para prevenir heridas e infecciones por pincharse accidentalmente con la aguja.